

Informazioni riassuntive per il paziente

Jakavi® (Ruxolitinib)

Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale Jakavi®.
Le seguenti informazioni Le consentiranno di aderire in modo ottimale alla terapia.

Che aspetto ha Jakavi®?



Jakavi® è disponibile in compresse da 5 mg, 10 mg, 15 mg e 20 mg:

Compresa da 5 mg: bianca, rotonda, contrassegnata con “NVR” su un lato e “L5” sull’altro.

Compresa da 10 mg: bianca, rotonda, contrassegnata con “NVR” su un lato e “L10” sull’altro.

Compresa da 15 mg: bianca, ovale, contrassegnata con “NVR” su un lato e “L15” sull’altro.

Compresa da 20 mg: bianca, allungata contrassegnata con “NVR” su un lato e “L20” sull’altro.

Come si conserva Jakavi®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Jakavi®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Jakavi®?

- Assuma la dose prescritta due volte al giorno mattina e sera all'incirca alla stessa ora con un bicchiere d'acqua.
- Indipendentemente dal pasto.
- Non divida, sciolga o trituri le compresse, ma le deglutisca intere, senza masticarle.

Che cosa faccio se ...

... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Non assuma la dose doppia per compensare la dose dimenticata, bensì assuma semplicemente la dose successiva alla solita ora.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.

... ho vomitato il farmaco?

- Non assuma il farmaco un'altra volta.
- Proseguo la terapia come d'abitudine assumendo il farmaco al consueto orario di somministrazione successivo.

... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti? Che cosa posso fare per contrastarli?

Mal di testa

- Sono consentiti gli antidolorifici da banco di uso corrente (p. es. Paracetamolo), non soggetti a prescrizione medica.

Fiato corto o vertigini

- Contatti immediatamente l'équipe curante.

Dolori ad urinare

- Contatti immediatamente l'équipe curante.

Eruzioni cutanee

- Contatti l'équipe curante.

Nausea/vomito/inappetenza

- Assuma tempestivamente i farmaci che Le sono stati prescritti contro tali effetti secondari.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Febbre oltre i 38°C.
- In caso di sanguinamenti, per es. dal naso o comparsa di sangue nell'urina.
- Disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.

Che cos'altro devo sapere?

- Il pompelmo può influire sull'efficacia del farmaco. Si astenga pertanto dal consumo di tale sostanza durante la terapia con Jakavi®.
- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.

