

## Personnes de contact

Médecin \_\_\_\_\_

Infirmières et infirmiers \_\_\_\_\_

Pharmacie \_\_\_\_\_

Urgences \_\_\_\_\_

## Remarques

---

---

---

---

---

---

---

---

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.

Version : Mars 2020

Référence : [www.swissmedicinfo.ch](http://www.swissmedicinfo.ch) (2024)

© L'association Anticancéreux par voie orale ([www.AntiCancereuxOraux.ch](http://www.AntiCancereuxOraux.ch))

Soutenue par

 Onkologiepflege Schweiz  
Soins en Oncologie Suisse  
Cure Oncologica Svizzera

 SSMO  
SSOM  
SGMO



Orale Tumor Therapie  
Anti Cancereux Oraux  
Therapie Orali in Oncologia  
.ch

## Information pour les patientes et les patients

# Kisqali® (Ribociclib)

**Kisqali® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.**

## Comment se présente Kisqali®?



Kisqali® Comprimé pelliculé à 200mg

Comprimé pelliculé à 200 mg : de couleur gris clair-violet de forme ronde, gravés d'un côté avec « RIC » en relief et sur l'autre face avec « NVR ».

## Comment conserver Kisqali®?

Conserver à température ambiante.

## À quelle dose Kisqali® doit-il être utilisé?

Selon la prescription de votre médecin.

## Comment dois-je prendre Kisqali®?

- Kisqali® doit être pris à la même heure chaque jour, de préférence le matin, avec ou sans nourriture.
- Avalez les comprimés entiers. Ne pas les mâcher, ni les casser, ou les écraser.
- Les comprimés qui ne se présentent pas dans leur forme intégrale ne doivent pas être pris.

## Qu'est-ce que je fais si...

### ...j'ai oublié le médicament?

- Ne prenez pas la dose oubliée plus tard. La dose suivante est prise à l'heure habituelle le lendemain.
- Notez la date de l'oubli du comprimé.

### ...j'ai vomi le médicament?

- Ne reprenez pas de comprimé après les vomissements.
- Poursuivez la thérapie le lendemain sans changement selon la prescription.

### ...j'ai pris trop de comprimés /capsules?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

## Quels sont les effets indésirables fréquents?

### Que puis-je faire?

#### Nausées/vomissements

- Prenez les médicaments antinauséux prescrits sans attendre.

#### Diarrhées

- Prenez du loperamide (p. ex. Imodium®) dès l'apparition des diarrhées selon prescription médicale.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Soyez attentif à boire en quantité suffisante (environ 2 litres par jour d'eau, de thé ou de bouillon).

## Constipation

- Si les symptômes de constipation persistent, demandez à votre équipe soignante un laxatif approprié.

## Maux de tête et de dos

- Les analgésiques en vente libre habituels sont autorisés.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

## Quand dois-je informer mon équipe soignante?

- En cas de fièvre supérieure à 38 ° C.
- En cas de signes infectieux tels que maux de gorge ou aphtes.
- En cas de fatigue importante et croissante.
- Si vous avez des démangeaisons, la peau ou le blanc des yeux qui jaunissent.
- Si vous avez des difficultés à respirer ou à avaler.
- Si vous avez des palpitations, des vertiges ou des jambes gonflées.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou d'autres troubles inexplicables ou si vous avez d'autres questions.

## Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez.

### Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

## Que dois-je encore savoir?

- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.
- Ne prenez pas de médicaments (y compris en vente libre) contre d'éventuels effets secondaires sans en parler à votre médecin. Ces produits peuvent interférer avec les effets du médicament.
- Pendant le traitement, vous ne devez pas absorber du pamplemousse ni des préparations à base de millepertuis. Ces produits peuvent interférer avec l'effet du médicament et son efficacité. Abstenez-vous donc de consommer ces produits pendant le traitement.