

Personnes de contact

Médecin

Infirmières

Pharmacie

Urgences

Remarques

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.

Version: octobre 2020

Référence : www.swissmedicininfo.ch

© Société Suisse d'Oncologie Médicale/Soins en Oncologie Suisse

Information pour les patients

Lanvis® (Thioguanin)

Lanvis® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Lanvis®?



Lanvis®

Comprimés de 40 mg.

Les comprimés de Lanvis® sont blancs ronds avec imprimé « T40 » sur l'une de leur face.

Comment conserver Lanvis®?

Conserver à température ambiante.

À quelle dose Lanvis® doit-il être utilisé?

Selon la dose prescrite par votre médecin.

Comment dois-je prendre Lanvis®?

- Prenez les comprimés avec un verre d'eau, au moins 1 heure avant ou au moins 2 heures après un repas de préférence à la même heure de la journée.
- Avalez les comprimés entiers. Ne pas les mâcher, ni les casser, ni les diviser, les dissoudre ou les écraser.

Qu'est-ce que je fais si ...

...j'ai oublié le médicament?

- La dose oubliée n'est pas rattrapée. La dose suivante est prise à l'heure habituelle le lendemain.
- Ne prenez jamais deux doses quotidiennes le même jour.
- Notez la date de l'oubli.

...j'ai vomi le médicament?

- Ne prenez pas de nouveaux comprimés le même jour.
- Continuez le traitement le lendemain sans changement.

...j'ai pris trop de comprimés /capsules?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents? Que puis-je faire?

Nausées, vomissements, perte d'appétit

- Prenez les médicaments antinauséeux prescrits sans attendre.
- Si vous ressentez une augmentation des symptômes ou s'il n'y a pas d'amélioration dans les 24 heures, contactez votre médecin.

Inflammation de la muqueuse buccale

- Rincer la bouche au minimum après chaque repas avec de l'eau ou de l'eau salée (1/2-1 c à t. de sel par litre d'eau).
- Sans amélioration et que boire ou s'alimenter devient difficile, veuillez, contactez votre équipe soignante.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante?

- Lorsque vous remarquez des signes d'infection tels que fièvre, frissons, mal de gorge ou toux et rhume.
- Si vous souffrez de nausées et/ou de vomissements persistants.
- En cas de saignement (p.ex. saignements de nez) ou petites taches cutanées de couleur rouge sur le corps.
- En cas de jaunissement de la peau et des yeux, d'urine foncée, de fatigue et de perte d'appétit.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez.

Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir?

- Pendant le traitement, la sensibilité au soleil augmente. Portez des vêtements de protection et utilisez un écran solaire avec un facteur de protection élevé (FPS 50).
- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.