




Information pour les patients

Lenalidomid Sandoz®

Lenalidomid Sandoz® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Lenalidomid Sandoz® ?



Lenalidomid Sandoz® : gélules de 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg et 25 mg.

Gélules de 2.5 mg : bleu-vert/blanc, marquées « L9NL2.5 » sur la partie inférieure.

Gélules à 5 mg : blanches, marquées « L9NL5 » sur la partie inférieure.

Gélules à 7.5 mg : beige clair, marquées « L9NL7.5 » sur la partie inférieure.

Gélules à 10 mg : bleu-vert, marquées « L9NL10 » sur la partie inférieure.

Gélules à 15 mg : turquoise, marquées « L9NL15 » sur la partie inférieure.

Gélules à 20 mg : bleu-vert/turquoise, marquées « L9NL20 » sur la partie inférieure.

Gélules à 25 mg : blanches, marquées « L9NL25 » sur la partie inférieure.

Comment conserver Lenalidomid Sandoz® ?

Conserver le médicament à température ambiante.

À quelle dose Lenalidomid Sandoz® doit-il être utilisé ?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Lenalidomid Sandoz® ?

- Prenez les gélules en une prise par jour, si possible à la même heure, avec un verre d'eau.
- Vous pouvez prendre les gélules avec ou sans nourriture.
- Avalez les gélules entières, ne pas les mâcher, ni les casser, ni les ouvrir, ni les écraser.

Qu'est-ce que je fais si...

...j'ai oublié le médicament ?

- Prenez la dose oubliée dans les 12 heures qui suivent, sinon ne la prenez pas par la suite. La prochaine prise se fait à l'heure prévue le lendemain. Ne prenez jamais deux doses le même jour.
- Notez la date de l'oubli.

...j'ai vomi le médicament ?

- Ne prenez pas de nouvelles gélules.
- Prenez la dose suivante sans changement à l'heure prévue.

...j'ai pris trop de comprimés ?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents ?

Que puis-je faire ?

Diarrhées

- Prenez sans tarder du Lopéramide (p.ex. Imodium®) selon prescription.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Veillez à boire en quantité suffisante environ 2 litres par jour (p.ex. eau, thé, bouillon).

Constipation

- Si les symptômes persistent, demandez à votre équipe de traitement de vous prescrire un laxatif approprié.

