

## Stanchezza

- In caso di sonnolenza pronunciata, è richiesta cautela nella guida di veicoli e nel utilizzo di macchinari pericolosi.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

## Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Difficoltà a respirare e/o palpitazioni.
- Segni d'infezione come febbre, brividi, infiammazione della gola o tosse e raffreddore.
- In caso di sanguinamenti dal naso o comparsa di sangue nelle urine.
- Disturbi persistenti o di origine sconosciuta.
- Se la sua pressione sanguigna aumenta o se la sua pressione alta nota peggiora.

**Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.**

## Che cos'altro devo sapere?

- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.

## Contatti

Medico

Personale infermieristico

Farmacista

Pronto soccorso

## Appunti

Con queste informazioni sintetiche, l'équipe curante intende facilitare la somministrazione della terapia orale ai pazienti oncologici e ai familiari curanti. La presente scheda informativa vuole essere un complemento al foglietto illustrativo e alle informazioni fornite dagli specialisti.

## Informazioni riassuntive per il paziente

# Lenvima® (Lenvatinib)

**Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale Lenvima®. Le seguenti informazioni Le consentiranno di aderire in modo ottimale alla terapia.**

## Che aspetto ha Lenvima®?



Lenvima® è disponibile in capsule rigide da 4 mg e 10 mg:  
Capsula da 4 mg: di colore rosso, con le diciture “E” e “LENV 4” contrassegnate in inchiostro nero rispettivamente sulla testa e sul corpo della capsula.  
Capsula da 10 mg: di colore giallo e testa di colore rosso, con le diciture “E” e “LENV 10” contrassegnate in inchiostro nero rispettivamente sulla testa e sul corpo della capsula.

## Come si conserva Lenvima®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

## Come si dosa Lenvima®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

## Come si somministra Lenvima®?

- Assuma la dose prescritta ogni giorno all'incirca alla stessa ora con un bicchiere d'acqua.
- Indipendentemente dal pasto.
- Deglutisca le capsule intere, non devono essere aperte, sciolte, spezzate o masticate.
- In caso di difficoltà a deglutire: versi un cucchiaino di acqua o succo di mela in un bicchierino e immerga le capsule nel liquido senza romperle né frantumarle. Lasci riposare per almeno 10 minuti, quindi, mescoli per almeno 3 minuti per sciogliere gli involucri. Ingerisca la sospensione. Dopo aver bevuto, aggiunga la stessa quantità di acqua o succo di mela, mescoli e ingerisca.

## Che cosa faccio se ...

### ... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Assuma la dose dimenticata il più presto possibile, ma in ogni caso entro 12 ore.
- Non assuma mai il doppio della dose giornaliera prescritta nello stesso giorno.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.

### ... ho vomitato il farmaco?

- Non assuma il farmaco un'altra volta.
- Proseguia la terapia il giorno successivo, attenendosi al consueto orario di somministrazione.

### ... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

## Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

### Che cosa posso fare per contrastarli?

#### Diarrea

- Assuma tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Consigliamo di bere circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

#### Nausea/vomito/inappetenza

- Assuma tempestivamente i farmaci che Le sono stati prescritti contro tali effetti secondari.
- Contatti il Suo medico qualora tali effetti secondari si aggravassero o perdurassero oltre 24 ore.

#### Infiammazione delle mucose orali

- Risciacqui la bocca con acqua o acqua salata dopo ogni pasto e, se possibile, anche tra i pasti (1/2-1 cucchiaino da tè di sale per 1 litro di acqua).
- Contatti l'équipe curante qualora l'infiammazione delle mucose orali non regredisce e/o Le impedisse di bere e di mangiare.

#### Mal di testa

- Sono consentiti gli antidolorifici da banco di uso corrente (p. es. Paracetamolo), non soggetti a prescrizione medica.

#### Dolori articolari e muscolari

- Sono consentiti gli antidolorifici da banco di uso corrente, non soggetti a prescrizione medica.
- Si ricordi di riferire tali sintomi al Suo medico in occasione della prossima visita medica.

#### Eruzioni cutanee

- Curi la pelle come consigliato dall'équipe curante.
- Non faccia uso di prodotti per la cute non espressamente consentiti dall'équipe curante.

#### Arrossamenti, vescicole e dolori ai palmi delle mani e dei piedi

- Applichi fin dall'inizio della terapia una crema o una lozione grassa, (contenenti urea) sulle mani e sui piedi.
- Eviti temperature estreme (p. es. il contatto prolungato con acqua fredda o calda).
- Eviti forti pressioni (p. es. scarpe strette).
- Interrompa la terapia e informi l'équipe curante in presenza di dolori e vescicole.

#### Perdita di capelli

- Chieda consiglio alla Sua équipe curante in merito a parrucche e copricapo.