



## Comment conserver Leukeran® ?

Conserver le médicament à l'abri de la lumière et de l'humidité au réfrigérateur.

## À quelle dose Leukeran® doit-il être utilisé ?

Selon la prescription de votre médecin.

## Comment dois-je prendre Leukeran® ?

- Prenez les comprimés en une seule prise par jour ou de manière fractionnée en plusieurs prises par jour.
- Prenez la dose totale ou fractionnée en une fois et à jeun au moins 1 heure avant ou au moins 3 heures après un repas léger.
- Avalez les comprimés entiers. Ne pas les croquer, ni les casser ou les écraser.

## Qu'est-ce que je fais si...

### ...j'ai oublié le médicament ?

- La prochaine prise aura lieu le lendemain à l'heure prévue.
- Notez la date de l'oubli.

### ...j'ai vomi le médicament ?

- Ne prenez pas de nouveaux comprimés.
- Prenez la dose suivante sans changement à l'heure prévue le lendemain.

### ...j'ai pris trop de comprimés ?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

## Quels sont les effets indésirables fréquents ?

### Que puis-je faire ?

#### Nausées/vomissements

- Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements sans attendre.
- S'il n'y a pas d'amélioration dans les 24 heures, contactez votre médecin.

#### Perte de cheveux

- Faites-vous conseiller par votre équipe de traitement pour une perruque ou d'autres moyens adaptés.

## Diarrhées

- Prenez du lopéramide (p. ex. Imodium®) suffisamment tôt dès l'apparition des diarrhées.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Veillez à boire en quantité suffisante environ 2 litres par jour (p. ex. de l'eau, du thé ou du bouillon).

## Inflammation de la muqueuse buccale

- Se rincer la bouche avec de l'eau ou de l'eau salée (1/2-1 cuillère à café/litre d'eau) au moins après chaque repas.
- Si aucune amélioration n'est constatée et que l'absorption de liquides et d'aliments est difficile, prendre contact avec l'équipe de traitement.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

## Quand dois-je informer mon équipe traitement ?

- Si la diarrhée ne peut être arrêtée avec la prise de Lopéramide (par ex. Imodium®) à la dose prescrite, soit avec un maximum de 8 gélules/comprimés par jour.
- Si vous êtes gêné par des zones rugueuses ou ouvertes dans la bouche.
- Si vous éprouvez des difficultés à avaler.
- En cas d'apparition d'une fièvre supérieure à 38°C.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou d'autres troubles inexplicables.

## Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez. Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

## Que dois-je encore savoir ?

- En cas de contact du comprimé avec la peau, rincez correctement la zone concernée avec de l'eau.
- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.