



Information pour les patients

Leukeran® (Chlorambucil)

**Leukeran® a été choisi pour vous par votre médecin.
Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.**

Comment se présente Leukeran® ?



Leukeran® : Comprimés à 2 mg.

Comprimés pelliculés : bruns, ronds, marqués « GX EG3 » sur une face et « L » sur l'autre.

Comment conserver Leukeran® ?

Conserver le médicament à l'abri de la lumière et de l'humidité au réfrigérateur.

À quelle dose Leukeran® doit-il être utilisé ?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Leukeran® ?

- Prenez les comprimés en une seule prise par jour ou de manière fractionnée en plusieurs prises par jour.
- Prenez la dose totale ou fractionnée en une fois et à jeun au moins 1 heure avant ou au moins 3 heures après un repas léger.
- Avalez les comprimés entiers. Ne pas les croquer, ni les casser ou les écraser.

Qu'est-ce que je fais si...

...j'ai oublié le médicament ?

- La prochaine prise aura lieu le lendemain à l'heure prévue.
- Notez la date de l'oubli.

...j'ai vomi le médicament ?

- Ne prenez pas de nouveaux comprimés.
- Prenez la dose suivante sans changement à l'heure prévue le lendemain.

...j'ai pris trop de comprimés ?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents ?

Que puis-je faire ?

Nausées/vomissements

- Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements sans attendre.
- S'il n'y a pas d'amélioration dans les 24 heures, contactez votre médecin.

Perte de cheveux

- Faites-vous conseiller par votre équipe de traitement pour une perruque ou d'autres moyens adaptés.

Diarrhées

- Prenez du loperamide (p. ex. Imodium®) suffisamment tôt dès l'apparition des diarrhées.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Veillez à boire en quantité suffisante environ 2 litres par jour (p. ex. de l'eau, du thé ou du bouillon).

Inflammation de la muqueuse buccale

- Se rincer la bouche avec de l'eau ou de l'eau salée (1/2-1 cuillère à café/litre d'eau) au moins après chaque repas.
- Si aucune amélioration n'est constatée et que l'absorption de liquides et d'aliments est difficile, prendre contact avec l'équipe de traitement.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe traitement ?

- Si la diarrhée ne peut être arrêtée avec la prise de Loperamide (par ex. Imodium®) à la dose prescrite, soit avec un maximum de 8 gélules/comprimés par jour.
- Si vous êtes gêné par des zones rugueuses ou ouvertes dans la bouche.
- Si vous éprouvez des difficultés à avaler.
- En cas d'apparition d'une fièvre supérieure à 38°C.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou d'autres troubles inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez. Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir ?

- En cas de contact du comprimé avec la peau, rincez correctement la zone concernée avec de l'eau.
- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.

Personnes de contact

Médecin

Infirmière / infirmier

Pharmacie

Urgences

Remarques

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.

Version : octobre 2017
Référence : www.swissmedicinfo.ch

© L'association Anticancéreux par voie orale www.anticancereuxoraux.ch

Soutenu par

 Onkologiepflege Schweiz
Soins en Oncologie Suisse
Cure Oncologica Svizzera

 SSMO
SSOM
SGMO