

Informazioni riassuntive per il paziente

Lonsurf® (Trifluridin)

Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale Lonsurf®.
Le seguenti informazioni Le consentiranno di aderire in modo ottimale alla terapia.

Che aspetto ha Lonsurf® ?



Lonsurf® è disponibile in compresse rivestite con film contenenti 15 mg e 20 mg di principio attivo.

La compressa da 15 mg è bianca, rotonda, con impresso «15» su un lato e «102» e «15 mg» sull'altro lato, con inchiostro grigio.

La compressa da 20 mg è rotonda e rosso pallido, con impresso «20» su un lato e «102» e «20» sull'altro lato, con inchiostro grigio.

Come si conserva Lonsurf®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Lonsurf®?

- Si attenga alla posologia prescritta dal medico.
- Un ciclo di terapia dura 28 giorni, si assume Lonsurf® due volte al giorno dal giorno 1 al giorno 5 e dal giorno 8 al giorno 12 di ogni ciclo di terapia.

Come si somministra Lonsurf®?

- Le compresse vanno assunte con un bicchiere d'acqua entro 1 ora dalla fine del pasto mattina e sera.
- Non divida, sciogla o trituri le compresse, ma le deglutisca intere, senza masticarle.

Che cosa faccio se ...

...ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Non assuma più tardi la dose dimenticata.
- Proseguo la terapia come d'abitudine assumendo il farmaco all'ora prestabilita.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.

...ho vomitato il farmaco?

- Non assumo il farmaco un'altra volta.
- Proseguo la terapia come d'abitudine assumendo il farmaco al consueto orario di somministrazione successivo.

...ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

Che cosa posso fare per contrastarli?

Inappetenza/perdita di peso

- Può essere utile consumare tanti piccoli pasti ripartiti sull'arco della giornata preferendo cibi di cui si ha voglia al momento.
- In caso d'inappetenza persistente, contatti la Sua équipe curante.

Diarrea

- Assuma tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Consigliamo di bere circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

Alterazioni del gusto

- Segnali importanti alterazioni del gusto all'équipe curante. Eventualmente può essere utile una consulenza dietetica.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Febbre oltre i 38 °C.
- Segni d'infezione come febbre, brividi, infiammazione della gola o tosse e raffreddore.
- Diarrea persistente malgrado la somministrazione della dose massima (8 capsule al giorno) della sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®).
- Sanguinamenti p.es. dal naso o dalle gengive.
- In caso di affaticamento grave e crescente.
- Altri disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.

Che cos'altro devo sapere?

- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.

