

Comment conserver Methotrexat Sandoz® ?

Conserver le médicament à température ambiante.

À quelle dose Methotrexat Sandoz® doit-il être utilisé ?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Methotrexat Sandoz® ?

- Prenez tous les comprimés en une prise par jour le matin, à jeun, 1 heure avant ou 2 heures après un repas.
- Les comprimés peuvent être pris indépendamment des repas à une dose inférieure ou égale à 15mg.
- Avalez les comprimés entiers avec de l'eau sans les mâcher, ni les casser ou les écraser.

Qu'est-ce que je fais si...

...j'ai oublié le médicament ?

- Ne reprenez pas de nouveaux comprimés.
- La prochaine prise a lieu le jour suivant à l'heure prévue.

...j'ai vomi le médicament ?

- Ne prenez pas de nouveaux comprimés.
- Poursuivez le traitement sans changement le lendemain.

...j'ai pris trop de comprimés /capsules ?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents ?

Que puis-je faire ?

Inflammation de la muqueuse buccale

- Rincez-vous la bouche à l'eau ou à l'eau salée (½ -1 cuillère à café / litre d'eau) au moins après chaque repas.
- S'il n'y a pas d'amélioration et que l'apport hydrique et alimentaire est altéré, contactez l'équipe de traitement.

Diarrhées

- Prenez du loperamide (p. ex. Imodium®) suffisamment tôt dès l'apparition des diarrhées.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Veillez à boire en quantité suffisante environ 2 litres par jour (p. ex. de l'eau, du thé ou du bouillon).

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante ?

- En cas de fièvre supérieure à 38°C.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou d'autres troubles inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez. Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir ?

- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.