

Contatti

Medico _____

Personale infermieristico _____

Farmacista _____

Pronto soccorso _____

Appunti

Con queste informazioni sintetiche, l'équipe curante intende facilitare la somministrazione della terapia orale ai pazienti oncologici e ai familiari curanti. La presente scheda informativa vuole essere un complemento al foglietto illustrativo e alle informazioni fornite dagli specialisti.

Versione: ottobre 2023

Fonte di riferimento: www.swissmedicinfo.ch

© L'associazione Terapia orale dei tumori www.terapieorallinoncologia.ch

Supportato da

 Onkologiepflege Schweiz
Soins en Oncologie Suisse
Cure Oncologique Svizzera

 SSMO
SSOM
SGMO



Orale Tumor Therapie
Anti Cancereux Oraux
Thérapie Orali in Oncologia
.ch

Informazioni riassuntive per il paziente

Orgovyx® (Relugolix)

Sta per iniziare una terapia con Orgovyx® potrà ottenere maggiori benefici se terrà conto delle seguenti raccomandazioni.

Che aspetto ha Orgovyx®?



Orgovyx® 120mg.

Compressa rivestita con film da 120mg, rosso chiaro, a forma di mandorla con «R» su un lato e «120» sull'altro.

Come si conserva Orgovyx®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Orgovyx®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Orgovyx®?

- Assuma la dose prescritta ogni giorno all'incirca alla stessa ora con un bicchiere d'acqua.
- Le compresse possono essere prese con o senza cibo.
- Non divida, sciolga o trituri le compresse, ma le deglutisca intere, senza masticarle.

Che cosa faccio se ...

... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Se si accorge di avere saltato una dose meno di 12 ore dopo l'orario abituale in cui avrebbe dovuto prenderla, la prenda non appena se ne ricorda e quindi continui ad assumere le compresse successive il giorno seguente come al solito. Se ha saltato una dose da più di 12 ore, non la assuma. Prenda soltanto la dose successiva il giorno seguente come al solito.

... ho vomitato il farmaco?

- Non assuma il farmaco un'altra volta.
- Prosegua la terapia il giorno successivo, all'ora stabilita.

... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

Che cosa posso fare per contrastarli?

Vampata di calore

- Di norma, le vampate di calore diminuiscono nel corso della terapia.
- Può discutere le opzioni per alleviare i sintomi con l'équipe curante.

Dolori muscolo scheletrici

- È consentita l'automedicazione con antidolorifici reperibili senza ricetta come, p.es. la sostanza attiva paracetamolo.
- Si ricordi di riferire tali sintomi al Suo medico in occasione della prossima visita medica.

Diarrea

- Assuma tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Cerchi di bere circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

Stitichezza

- Cerchi di fare dell'attività fisica moderata.
- Cerchi di bere circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).
- In caso di stitichezza persistente chiedi alla Sua équipe curante di indicarle un lassativo idoneo.

Stanchezza

- La stanchezza può ridurre l'idoneità alla guida e la capacità di azionare macchine o attrezzi pericolosi.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Se soffre di gonfiori alle gambe.
- Difficoltà a respirare e/o palpitazioni, eventualmente accompagnati da febbre e tosse.

Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.

- Possono verificarsi interazioni con altri medicinali e preparati (compresi quelli a base di erbe).

Che cos'altro devo sapere?

- Non interrompa l'uso di questo medicinale senza averne parlato con il medico.
- Non assuma prodotti contenenti erba di San Giovanni (iperico) durante il trattamento. Queste sostanze possono modificare l'efficacia del medicinale.