



Informazioni riassuntive per il paziente

Orgovyx® (Relugolix)

Sta per iniziare una terapia con Orgovyx® potrà ottenere maggiori benefici se terrà conto delle seguenti raccomandazioni.

Che aspetto ha Orgovyx®?



Orgovyx® 120mg.

Compressa rivestita con film da 120mg, rosso chiaro, a forma di mandorla con «R» su un lato e «120» sull'altro.

Come si conserva Orgovyx®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Orgovyx®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Orgovyx®?

- Assuma la dose prescritta ogni giorno all'incirca alla stessa ora con un bicchiere d'acqua.
- Le compresse possono essere prese con o senza cibo.
- Non divida, sciolga o trituri le compresse, ma le deglutisca intere, senza masticarle.

Che cosa faccio se ...

... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Se si accorge di avere saltato una dose meno di 12 ore dopo l'orario abituale in cui avrebbe dovuto prenderla, la prenda non appena se ne ricorda e quindi continui ad assumere le compresse successive il giorno seguente come al solito. Se ha saltato una dose da più di 12 ore, non la assuma. Prenda soltanto la dose successiva il giorno seguente come al solito.

... ho vomitato il farmaco?

- Non assuma il farmaco un'altra volta.
- Prosegua la terapia il giorno successivo, all'ora stabilita.

... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

Che cosa posso fare per contrastarli?

Vampata di calore

- Di norma, le vampate di calore diminuiscono nel corso della terapia.
- Può discutere le opzioni per alleviare i sintomi con l'équipe curante.

Dolori muscolo scheletrici

- È consentita l'automedicazione con antidolorifici reperibili senza ricetta come, p.es. la sostanza attiva paracetamolo.
- Si ricordi di riferire tali sintomi al Suo medico in occasione della prossima visita medica.

