



Merkblatt für Patientinnen und Patienten

Orserdu® (Elacestrant)

Sie beginnen eine Therapie mit Orserdu® und können diese positiv beeinflussen, wenn Sie die nachfolgenden Informationen beachten.

Wie sieht Orserdu® aus?



Orserdu® Filmtablette zu 86mg:
Blaue bikonvexe runde Filmtabletten auf einer Seite mit «ME» gekennzeichnet.
Orserdu® Filmtablette zu 345mg:
Blaue bikonvexe ovale Filmtabletten auf einer Seite mit «MH» gekennzeichnet.

Wie muss Orserdu® aufbewahrt werden?

Bewahren Sie das Medikament bei Raumtemperatur auf.

Wie ist die Dosierung von Orserdu®?

Nehmen Sie die Tabletten einmal täglich gemäss der Verordnung Ihrer Ärztin/Ihres Arztes ein.

Wie nehme ich Orserdu® ein?

- Nehmen Sie die Tabletten einmal täglich, möglichst zur gleichen Zeit, mit einem Glas Wasser ein.
- Nehmen Sie die Tabletten zu einer Mahlzeit ein, um Übelkeit vorzubeugen.
- Schlucken Sie die Tabletten ganz. Die Tabletten weder kauen, noch brechen oder mörsern.

Was mache ich, wenn ich...

... das Medikament vergessen habe?

- Bis zu 6 Stunden nach dem üblichen Einnahmezeitpunkt können Sie die Tabletten noch einnehmen. Wenn mehr als sechs Stunden vergangen sind, ist die Dosis an diesem Tag auszulassen. Nehmen Sie am folgenden Tag die Tabletten zum üblichen Zeitpunkt ein.
- Notieren Sie sich dieses Datum.
- Nehmen Sie nie zwei Tagesdosen am gleichen Tag ein.

... das Medikament erbrechen musste?

- Nehmen Sie keine neuen Tabletten ein.
- Setzen Sie die Therapie am nächsten Tag unverändert fort.

... zu viele Kapseln eingenommen habe?

- Kontaktieren Sie umgehend das Behandlungsteam, damit das weitere Vorgehen festgelegt werden kann.

Welche Nebenwirkungen sind häufig?

Was kann ich dagegen tun?

Übelkeit / Erbrechen (sehr selten)

- Nehmen Sie die dagegen verordneten Medikamente frühzeitig ein.
- Wenn innerhalb von 24 Stunden keine Besserung eintritt, nehmen Sie mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt Kontakt auf.

