

Come si conserva Orserdu®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Orserdu®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Orserdu®?

- Assuma la dose prescritta ogni giorno all'incirca alla stessa ora con un bicchiere d'acqua.
- Assumendo le compresse con il cibo è possibile ridurre la nausea e il vomito.
- Non divida, sciolga o trituri le compresse, ma le deglutisca intere, senza masticarle.

Che cosa faccio se ...

... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Può prendere la dose dimenticata se non sono trascorse più di 6 ore dall'orario previsto per l'assunzione. Se sono trascorse più di 6 ore salti la dose per quel giorno e prenda la dose successiva il giorno seguente all'orario consueto.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.
- Non prenda una dose doppia per compensare quella saltata.

... ho vomitato il farmaco?

- Non assuma il farmaco un'altra volta.
- Prosegua la terapia il giorno successivo, all'ora prestabilita.

... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

Che cosa posso fare per contrastarli?

Nausea/vomito

- Assuma tempestivamente i farmaci contro la nausea e il vomito (antiemetici) che Le sono stati prescritti.
- Contatti il Suo medico qualora la nausea/il vomito perdurassero oltre 24 ore.

Mal di testa, dolori alle articolari o alla schiena

- È consentita l'automedicazione con antidolorifici reperibili senza ricetta come, p.es. la sostanza attiva paracetamolo.
- Si ricordi di riferire tali sintomi al Suo medico in occasione della prossima visita medica.

Diarrea

- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Consigliamo di bere circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).
- Assuma tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Alterazioni della cute (eruzione, arrossamento).
- In caso di affaticamento grave e crescente.
- Difficoltà a respirare e/o palpitazioni oppure capogiri eventualmente accompagnati da febbre e tosse.
- Altri disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.

- Possono verificarsi interazioni con altri medicinali e preparati (compresi quelli a base di erbe).

Che cos'altro devo sapere?

- Non assuma prodotti contenenti pompelmo o erba di San Giovanni (iperico) durante il trattamento. Queste sostanze possono modificare l'efficacia del medicinale.
- Non interrompa l'uso di questo medicinale senza averne parlato con il medico.