

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Febbre oltre i 38 °C.
- Diarrea persistente malgrado la somministrazione della dose massima (8 capsule/comprese al giorno) della sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®).
- Altri disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.

Che cos'altro devo sapere?

- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.
- Il pompelmo e l'erba di San Giovanni (iperico) sono controindicati durante la terapia con Pemazyre®. Tali prodotti possono ridurre l'efficacia del farmaco. Si astenga pertanto dal consumo di tali sostanze durante la terapia con Pemazyre®.

Contatti

Medico

Personale infermieristico

Farmacista

Pronto soccorso

Appunti

Con queste informazioni sintetiche, l'équipe curante intende facilitare la somministrazione della terapia orale ai pazienti oncologici e ai familiari curanti. La presente scheda informativa vuole essere un complemento al foglietto illustrativo e alle informazioni fornite dagli specialisti.

Versione: Agosto 2022

Fonte di riferimento: www.swissmedicinfo.ch

© L'associazione Terapia orale dei tumori www.terapioraliinoncologia.ch

Supportato da



Orale Tumor Therapie
Anti Cancereux Oraux
Terapie Orali in Oncologia

.ch

Informazioni riassuntive per il paziente

Pemazyre® (Pemigatinib)

Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale Pemazyre®. Le seguenti informazioni Le consentiranno di aderire in modo ottimale alla terapia.

Che aspetto ha Pemazyre®?



Pemazyre® è disponibile in compresse da 4.5 mg, 9 mg, 13.5 mg.

Pemazyre® compresse da 4.5 mg: rotonde, da bianco a colore crema, con impresso «I» su un lato e «4.5» sull'altro.

Pemazyre® compresse da 9 mg: ovali, da bianco a colore crema, con impresso «I» su un lato e «9» sull'altro.

Pemazyre® compresse da 13.5 mg: rotonde, da bianco a colore crema, con impresso «I» su un lato e «13.5» sull'altro.

Come si conserva Pemazyre®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Pemazyre®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Pemazyre®?

- Assuma la dose giornaliera prescritta dal medico una volta al giorno, se possibile, sempre alla stessa ora, con un bicchiere d'acqua.
- Può assumere le compresse in concomitanza o meno dei pasti.
- Non divida o trituri le compresse, ma le deglutisca intere, senza masticarle.

Che cosa faccio se...

...ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Assuma la dose dimenticata fino a quattro ore dopo l'ora prestabilita.

...ho vomitato il farmaco?

- Non assumi il farmaco un'altra volta.
- Prosegua la terapia il giorno successivo, all'ora prestabilita.

...ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

Che cosa posso fare per contrastarli?

Infiemmazione o irritazione oculare

- Contatti la sua équipe curante se sviluppa lacrimazione/secchezza, infiammazione, sensibilità alla luce, vista offuscata o dolore agli occhi.
- Per alleviare eventuali sintomi d'infiammazione o il prurito applichi impacchi freddi sulle palpebre.
- Indossi degli occhiali da sole quando è all'aperto.

Nausea/vomito

- Assuma tempestivamente i farmaci contro la nausea e il vomito che Le sono stati prescritti.
- Contatti il Suo medico qualora la nausea e il vomito perdurassero oltre 24 ore.

Diarra

- Beva almeno 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane).
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Assuma tempestivamente un farmaco con la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®).

Stitichezza

- In caso di stitichezza persistente chiedi all'équipe curante di indicarti un lassativo idoneo.

Infiemmazione delle mucose orali

- Risciacqui la bocca con acqua o acqua salata più volte al giorno e dopo ogni pasto (1/2-1 cucchiaino per 1 litro d'acqua).
- Contatti l'équipe curante qualora l'infiammazione non regredisce e/o Le impedisce di bere e di mangiare.

Arrossamenti, vescicole e dolori ai palmi delle mani e dei piedi

- Applichi fin dall'inizio della terapia una crema o una lozione grassa, idratante (contenenti urea) sulle mani e sui piedi.
- Eviti temperature estreme (p. es. il contatto prolungato con acqua calda).
- Eviti forti pressioni (p. es. scarpe strette).
- Informi l'équipe curante in presenza di dolori e vescicole.

Alterazioni ungueali

- Eviti pressioni o lesioni sulle unghie (p. es. mangiarsi le unghie, rimuovere le cuticole, calzature troppo strette).
- Eviti il contatto prolungato con l'acqua o con sostanze chimiche come detersivi e solventi per unghie.
- Cura delle unghie: tagli le unghie dritte e non troppo corte; applichi ogni giorno una crema contenente urea (urea 4-10%) intorno all'unghia.
- Se necessario, applichi un indurente per unghie.
- Non usi unghie finte durante la terapia.

Dolori articolari e muscolari

- Sono consentiti gli antidolorifici di uso corrente, non soggetti a prescrizione medica (p. es. paracetamolo).
- Si ricordi di riferire tali sintomi al Suo medico in occasione della prossima visita medica.

Stanchezza

- In caso di sonnolenza pronunciata, è richiesta cautela nella guida di veicoli e nell'utilizzo di macchinari pericolosi.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.