

Informazioni riassuntive per il paziente

Puri-Nethol® (Mercaptopurin)

Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale Puri-Nethol®.
Le seguenti informazioni Le consentiranno di aderire in modo ottimale alla terapia.

Che aspetto ha Puri-Nethol®?



Puri-Nethol® compresse da 50 mg.

La compressa è di colore beige, rotonda con impresso da un lato sulla parte superiore della scanalatura «GX» e sulla parte inferiore «EX 2» liscia dall'altro lato.

Come si conserva Puri-Nethol®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Puri-Nethol®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Puri-Nethol®?

- Assuma le compresse a digiuno, almeno 2 ore dopo il pasto precedente e 1 ora prima di quello successivo.
- Assuma le compresse con un bicchiere d'acqua.
- Non divida, sciolga o trituri le compresse, ma le deglutisca intere, senza masticarle.

Che cosa faccio se ...

... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Non assuma più tardi la dose dimenticata. Prosegua la terapia il giorno successivo, attenendosi al consueto orario di somministrazione.
- Non assuma una dose doppia, durante lo stesso giorno, per compensare la dimenticanza.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.
- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

... ho vomitato il farmaco?

- Non assumi il farmaco un'altra volta.
- Prosegua la terapia il giorno successivo come d'abitudine.

... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti? Che cosa posso fare per contrastarli?

Nausea/vomito/inappetenza

- Assuma tempestivamente i farmaci che Le sono stati prescritti contro tali effetti secondari.
- Contatti il Suo medico qualora tali effetti secondari si aggravassero o perdurassero oltre 24 ore.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Segni d'infezione come febbre, brividi, infiammazione della gola o tosse e raffreddore.
- Nausea e/o vomito persistenti.
- Segni di sanguinamento (p.es. sangue dal naso), o comparsa di lividi sul corpo.
- Pelle di colore giallo o ingiallimento del bianco degli occhi, urine scure, feci chiare, stanchezza e inappetenza. Altri disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

**Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume.
Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.**

Che cos'altro devo sapere?

Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.

