

**Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez. Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.**

### Que dois-je encore savoir ?

- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.
- Vous ne devez pas prendre de préparations à base de pamplemousse ou millepertuis pendant le traitement. Ces produits peuvent interférer avec l'effet du médicament. Par conséquent, veillez à ne pas consommer ces produits pendant le traitement.

### Personnes de contact

Médecin \_\_\_\_\_

Infirmière / infirmier \_\_\_\_\_

Pharmacie \_\_\_\_\_

Urgences \_\_\_\_\_

### Remarques

---

---

---

---

---

---

---

---

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.

Version : août 2022  
Référence : [www.swissmedinfo.ch](http://www.swissmedinfo.ch) (2022)

© L'association Anticancéreux par voie orale [www.anticancereuxoraux.ch](http://www.anticancereuxoraux.ch)

Soutenu par

 Onkologiepflege Schweiz  
Soins en Oncologie Suisse  
Cure Oncologica Svizzera

 SSMO  
SSOM  
SGMO



OraleTumorTherapie  
Anti Cancereux Oraux  
Therapie Orali in Oncologia  
.ch

## Information pour les patients

# Rozlytrek® (Entrectinib)

**Rozlytrek® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.**

### Comment se présente Rozlytrek® ?



Rozlytrek® : Gélules à 100mg et 200mg.

Rozlytrek® gélules à 100mg jaune-beige, marquées d'un côté avec « ENT100 ».

Rozlytrek® gélules à 200mg orange-rouge, marquées d'un côté avec « ENT200 ».

## Comment conserver Rozlytrek® ?

Conserver le médicament à température ambiante.

## À quelle dose Rozlytrek® doit-il être utilisé ?

Selon la prescription de votre médecin.

## Comment dois-je prendre Rozlytrek® ?

- Prenez les gélules en une prise par jour, si possible à la même heure – avec ou sans nourriture - avec un verre d'eau.
- Avalez les comprimés entiers. Ne pas les mâcher, ni les casser ou les écraser, ni les ouvrir ou les dissoudre.

## Qu'est-ce que je fais si...

### ...j'ai oublié le médicament ?

- Vous pouvez prendre la prise oubliée le même jour, si 12 heures au moins séparent cette dose et celle du jour suivant. S'il reste moins de 12 heures avant votre prochaine prise, ne prenez pas la prise oubliée. Prenez la dose suivante à l'heure habituelle.
- Ne prenez jamais deux doses le même jour.
- Notez la date de l'oubli.

### ...j'ai vomi le médicament ?

- Si vous vomissez immédiatement après avoir pris une dose de Rozlytrek, vous pouvez prendre une autre dose.
- Sinon, ne prenez pas d'autre dose, mais prenez la dose suivante le lendemain à l'heure prévue.
- Continuez le traitement le lendemain sans changement.

### ...j'ai pris trop de comprimés ?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

## Quels sont les effets indésirables fréquents ?

### Que puis-je faire ?

#### Fatigue

- En cas de fatigue importante, veuillez faire preuve de prudence lors de la conduite de véhicule ou de l'utilisation de machines dangereuses.

#### Œdèmes

(Gonflement dû à la rétention de liquide corporel - souvent autour des yeux et des chevilles et prise de poids rapide).

- Contactez immédiatement votre équipe de traitement.

#### Vertiges

- Faites preuve de prudence au lever.
- Si les troubles persistent, prenez contact avec votre équipe de traitement.

#### Nausées/vomissements

- Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements sans attendre.
- S'il n'y a pas d'amélioration dans les 24 heures, contactez votre médecin.

#### Diarrhées

- Prenez sans tarder du Lopéramide (p.ex. Imodium®) selon prescription.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Buvez environ 2 litres par jour (p.ex. eau, thé, bouillon).

#### Constipation

- Si les symptômes persistent, demandez à votre équipe de traitement de vous prescrire un laxatif approprié.

#### Troubles de la sensibilité

- Lors de votre prochaine consultation, informez l'équipe de traitement de tout trouble de la sensibilité (p.ex. engourdissement, fourmillement).

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

## Quand dois-je informer mon équipe traitement ?

- Si des troubles visuels apparaissent, par exemple une vision floue ou une dégradation de la vision.
- Si vous souffrez d'essoufflement et/ou de palpitations cardiaques.
- Si la diarrhée ne peut être arrêtée avec la prise de Lopéramide (par ex. Imodium®) à la dose prescrite, soit avec un maximum de 8 gélules/comprimés par jour.
- Si vous souffrez de forts gonflements et de douleurs articulaires.
- Si vous remarquez des changements d'humeur, des problèmes de mémoire.
- En cas de convulsion.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou de troubles inexplicables.