



## Comment conserver Rydapt® ?

Conserver le médicament à température ambiante (pas au-dessus de 30°C).

## À quelle dose Rydapt® doit-il être utilisé ?

Selon la prescription de votre médecin.

## Comment dois-je prendre Rydapt® ?

- Prenez les capsules prescrites le matin et le soir à des intervalles d'environ 12 heures.
- Prenez les capsules avec de la nourriture afin de prévenir les nausées.
- Avalez la capsule en entier. N'ouvrez pas la capsule, ne la mâchez pas et ne l'écrasez pas.

## Qu'est-ce que je fais si...

### ...j'ai oublié le médicament ?

- Ne prenez pas la dose oubliée ultérieurement. Prenez la dose suivante comme d'habitude, à l'heure habituelle.
- Ne prenez jamais deux doses en une fois.
- Notez de la date de l'oubli.

### ...j'ai vomi le médicament ?

- Ne prenez pas de nouvelle capsule.
- Prenez la dose suivante au prochain horaire prévu.

### ...j'ai pris trop de comprimés ?

- Contactez votre équipe de traitement pour fixer la prochaine prise.

## Quels sont les effets indésirables fréquents ?

### Que puis-je faire ?

#### Nausées/Vomissements

- Prenez les médicaments prescrits sans attendre pour y remédier.
- S'il n'y a pas d'amélioration dans les 24 heures, contactez votre équipe de traitement.

#### Inflammation de la muqueuse buccale

- Rincez-vous la bouche plusieurs fois par jour, au moins après chaque repas, avec de l'eau ou de l'eau salée (½ - 1 cuillère à café/litre d'eau).
- Si aucune amélioration n'est constatée et que l'absorption de liquides et de nourriture devient difficile, contactez l'équipe de traitement.

#### Douleurs articulaires, musculaires et maux de tête ou de ventre

- Les antidouleurs habituels en vente libre (p. ex. paracétamol) sont autorisés.

#### Éruption cutanée

- Effectuer les soins de peau selon les instructions de l'équipe de traitement.
- N'utilisez aucun produit sans consulter au préalable votre équipe de traitement.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets indésirables peuvent apparaître.

## Quand dois-je informer mon équipe de traitement ?

- Si vous remarquez des signes d'infection tels que fièvre supérieure à 38°C, des frissons, une irritation de la gorge ou une toux et un rhume.
- En cas d'apparition de saignements p.ex. nez, gencives.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou d'autres troubles inexplicables.

**Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez. Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.**

## Que dois-je encore savoir ?

- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.