



Information pour les patientes et les patients

Rydapt® (Midostaurin)

Vous commencez un traitement avec Rydapt® et pouvez l'influencer positivement si vous observez les informations suivantes.

Comment se présente Rydapt®?



Rydapt® : Capsule molle à 25mg.
Capsules : oblongue, orange clair, marquée « PKC NVR » en rouge.

Comment conserver Rydapt® ?

Conserver le médicament à température ambiante (pas au-dessus de 30°C).

À quelle dose Rydapt® doit-il être utilisé ?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Rydapt® ?

- Prenez les capsules prescrites le matin et le soir à des intervalles d'environ 12 heures.
- Prenez les capsules avec de la nourriture afin de prévenir les nausées.
- Avalez la capsule en entier. N'ouvrez pas la capsule, ne la mâchez pas et ne l'écrasez pas.

Qu'est-ce que je fais si...

...j'ai oublié le médicament ?

- Ne prenez pas la dose oubliée ultérieurement. Prenez la dose suivante comme d'habitude, à l'heure habituelle.
- Ne prenez jamais deux doses en une fois.
- Notez de la date de l'oubli.

...j'ai vomi le médicament ?

- Ne prenez pas de nouvelle capsule.
- Prenez la dose suivante au prochain horaire prévu.

...j'ai pris trop de comprimés ?

- Contactez votre équipe de traitement pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents ? Que puis-je faire ?

Nausées/Vomissements

- Prenez les médicaments prescrits sans attendre pour y remédier.
- S'il n'y a pas d'amélioration dans les 24 heures, contactez votre équipe de traitement.

