

Information pour les patients

Sprycel® (Dasatinib)

Sprycel® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Sprycel®?



Sprycel® comprimés filmés à 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 120 mg et 140 mg.

Comprimés filmés à 20 mg: Comprimés filmés ronds, blancs, marqués d'un côté avec «BMS» et de l'autre avec «527».

Comprimés filmés à 50 mg: Comprimés filmés ronds, blancs, marqués d'un côté avec «BMS» et de l'autre avec «528».

Comprimés filmés à 70 mg: Comprimés filmés ronds, blancs, marqués d'un côté avec «BMS» et de l'autre avec «524».

Comprimés filmés à 80 mg: Comprimés filmés triangulaires, blancs, marqués d'un côté avec «BMS 80» et de l'autre avec «855».

Comprimés filmés à 100 mg: Comprimés filmés ovales, blancs, marqués d'un côté avec «BMS 100» et de l'autre avec «852».

Comprimés filmés à 140 mg: Comprimés filmés ronds, blancs, marqués d'un côté avec «BMS 140» et de l'autre avec «857».

Comment conserver Sprycel®?

Entreposez le médicament à l'air ambiant.

A quelle dose Sprycel® doit être utilisé?

Prenez les comprimés filmés à la dose prescrite par votre médecin.

Comment dois-je prendre Sprycel®?

- Prenez les comprimés filmés en une prise par jour avec un verre d'eau, de préférence toujours à la même heure.
- Avalez les comprimés filmés en entier. Ne pas mâcher, casser, ouvrir ou écraser les comprimés filmés.

Qu'est-ce que je fais si...

... j'ai oublié le médicament?

- Vous pouvez encore prendre la dose manquée le même jour.
- Notez cette date.
- Ne prenez jamais deux doses journalières le même jour.

... j'ai vomi le médicament?

- Ne prenez pas de nouveaux comprimés filmés le même jour.
- Continuez le traitement le lendemain sans changement.

... j'ai pris trop de comprimés filmés?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents?

Que puis-je faire?

Œdème (Gonflement dû à la rétention de fluide corporel - souvent autour des yeux et des chevilles et prise de poids rapide)

- Contactez avec votre équipe soignante sans attendre.

Maux de tête, douleurs articulaires et musculaires

- Les antidouleurs en vente libre sont autorisés (p.ex. Paracétamol).

Eruptions cutanées, rougeurs

- Suivez les instructions pour les soins de peau données par votre équipe soignante.

Nausées, vomissements

- Prenez les médicaments prescrits sans attendre.

Diarrhées

- Prenez sans tarder du Lopéramide (p.ex. Imodium®) selon prescription.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Buvez environ 2 litres par jour (p.ex. eau, thé, bouillon).

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante?

- Si vous remarquez des signes d'infection tels que fièvre, frissons, maux de gorge ou une toux et un écoulement nasal.
- En cas de signes de saignement sur la peau ou les muqueuses (p.ex. petits points rouges, ecchymoses, saignements de nez ou des gencives).
- Si vous souffrez d'essoufflement et/ou de palpitations cardiaques.
- Si la diarrhée ne peut être stoppée avec la prise de Lopéramide (p.ex. Imodium®) à la dose prescrite, soit avec un maximum de 8 gélules/comprimés par jour.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez. Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir?

- Pendant le traitement, vous ne devez pas absorber de préparation à base de pamplemousse. Ces produits peuvent interférer avec l'effet de Sprycel®. Abstenez-vous donc de consommer ces produits pendant le traitement.
- Les médicaments inhibant la production de suc gastrique (inhibiteurs de la pompe à protons, antagonistes des récepteurs H2) peuvent entraver l'absorption de Sprycel®. Consultez votre médecin.
- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.

Personnes de contact

Médecin

Infirmières

Pharmacie

Urgences

Remarques

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.

Version: Décembre 2013

Référence: www.swissmedicinfo.ch

© Société Suisse d'Oncologie Médicale/Soins en Oncologie Suisse