

Contatti

Medico

Personale infermieristico

Farmacista

Pronto soccorso

Appunti

Con queste informazioni sintetiche, l'équipe curante intende facilitare la somministrazione della terapia orale ai pazienti oncologici e ai familiari curanti. La presente scheda informativa vuole essere un complemento al foglietto illustrativo e alle informazioni fornite dagli specialisti.

Informazioni riassuntive per il paziente

Sprycel® (Dasatinib)

**Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale Sprycel®.
Le seguenti informazioni Le consentiranno di ottenere effetti ottimali dalla
terapia.**

Che aspetto ha Sprycel® ?



Sprycel® è disponibile in compresse rivestite rigide, contenenti 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg o 140 mg di principio attivo.

Le compresse rivestite da 20 mg sono rotonde e di colore bianco. Su un lato riportano la scritta «BMS» e sull'altro sono contrassegnate con il numero «527».

Le compresse rivestite da 50 mg sono ovali e di colore bianco. Su un lato riportano la scritta «BMS» e sull'altro sono contrassegnate con il numero «528».

Le compresse rivestite da 70 mg sono rotonde e di colore bianco. Su un lato riportano la scritta «BMS» e sull'altro sono contrassegnate con il numero «524».

Le compresse rivestite da 80 mg sono triangolari e di colore bianco. Su un lato riportano la scritta «BMS80» e sull'altro sono contrassegnate con il numero «855».

Le compresse rivestite da 100 mg sono ovoidi e di colore bianco. Su un lato riportano la scritta «BMS100» e sull'altro sono contrassegnate con il numero «852».

Le compresse rivestite da 140 mg sono rotonde e di colore bianco. Su un lato riportano la scritta «BMS140» e sull'altro sono contrassegnate con il numero «857».

Come si conserva Sprycel®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Sprycel®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Sprycel®?

- Assuma la dose giornaliera che Le è stata prescritta dal medico una volta al giorno, se possibile sempre alla stessa ora indipendentemente dal pasto.
- Le compresse devono essere assunte intere, con abbondante acqua, senza essere né masticate né succhiate e neppure triturate.

Che cosa faccio se ...

... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Assuma la dose dimenticata il più presto possibile, ma in ogni caso ancora il giorno stesso.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.
- NON assuma MAI la dose giornaliera prescritta due volte nello stesso giorno.

... ho vomitato il farmaco?

- NON assumi il farmaco un'altra volta.
- Il giorno successivo prosegua con la terapia come d'abitudine.

... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Avverta immediatamente la Sua équipe curante.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

Che cosa posso fare per contrastarli?

Edemi

- Gli edemi sono dei gonfiori, dovuti a ritenzione di liquidi, che possono formarsi agli arti inferiori (caviglie, piedi e gambe), ma anche alle mani e al viso, con conseguente repentino aumento di peso.
- Avvisi tempestivamente l'équipe curante.

Mal di testa (cefalea), dolori muscolari e articolari

- È consentita l'automedicazione con antidolorifici reperibili senza ricetta come, per esempio, la sostanza attiva paracetamolo.

Eruzioni e/o arrossamenti cutanei

- Assuma tempestivamente i farmaci contro la nausea e il vomito (antiemetici) che Le sono stati prescritti.

Nausea/vomito

- Assuma tempestivamente i farmaci contro la nausea e il vomito (antiemetici) che Le sono stati prescritti.

Diarrea

- Assuma per tempo la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Cerchi di bere almeno 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Segni d'infezione come febbre, brividi, infiammazione della gola o tosse e raffreddore
- Segni di sanguinamento sulla pelle o sulle mucose, p. es. petecchie (puntini rossi), ematomi (macchie bluastre), epistassi (sanguinamento dal naso) o emorragie gengivali
- Affanno respiratorio e/o palpitazioni
- Diarrea persistente malgrado la somministrazione della dose massima (8 capsule al giorno) normalmente consentita della sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®)
- Altri disturbi persistenti o di origine sconosciuta

Il Suo medico deve sapere quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.

Che cos'altro devo sapere?

- Durante la terapia con Sprycel® è controindicato il consumo di prodotti a base di pompelmo. Essi possono alterare l'efficacia del farmaco. Si astenga pertanto dall'assunzione di tali prodotti durante la terapia.
- I farmaci che riducono la produzione di succhi gastrici (inibitori della pompa protonica, antagonisti dei recettori H2) possono inibire l'assorbimento di Sprycel®. Informi il medico di eventuali terapie concomitanti.
- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.