

Que dois-je encore savoir?

- Pendant le traitement, vous ne devez pas absorber de préparation à base de pamplemousse. Ces produits peuvent interférer avec l'effet du Stivarga®. Abstenez-vous donc de consommer ces produits pendant le traitement.
- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.

Personnes de contact

Médecin

Infirmières

Pharmacie

Urgences

Remarques

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.

Version: Décembre 2013

Référence: www.swissmedicinfo.ch

© Société Suisse d'Oncologie Médicale/Soins en Oncologie Suisse

Information pour les patients

Stivarga® (Regorafenib)

Stivarga® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Stivarga®?



Stivarga® comprimés filmés à 40 mg:

Comprimés filmés rose clair, ovales, marqués sur un côté avec le signe «Bayer» et sur l'autre avec «40».

Comment conserver Stivarga®?

Entreposez le médicament à l'air ambiant.

A quelle dose Stivarga® doit être utilisé?

Prenez les comprimés filmés à la dose prescrite par votre médecin.

Comment dois-je prendre Stivarga®?

- Prenez les comprimés filmés une fois par jour, avec un verre d'eau, de préférence toujours à la même heure avec ou après un repas léger.
- Avalez les comprimés filmés en entier. Ne pas mâcher, casser, ouvrir ou écraser les comprimés filmés.

Qu'est-ce que je fais si...

... j'ai oublié le médicament?

- Prenez la dose manquée par la suite le même jour. Prenez la prochaine dose à l'heure habituelle du jour suivant.
- Ne prenez jamais deux doses journalières le même jour.
- Notez cette date.

... j'ai vomi le médicament?

- Ne prenez pas de nouveaux comprimés filmés le même jour.
- Continuez le traitement le lendemain sans changement.

... j'ai pris trop de comprimés?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents?

Que puis-je faire?

Rougeurs, cloques et douleur dans les mains et les plantes des pieds

- Dès le début du traitement, frotter la paume de vos mains et la plante de vos pieds avec une crème ou une lotion grasse.
- Évitez les températures extrêmes (p.ex. ne laissez pas les mains longtemps dans l'eau chaude).
- Évitez les excès de pression (p.ex. les chaussures serrées).
- En cas de douleur et d'apparition d'ampoules, stoppez le traitement et prenez immédiatement contact avec votre médecin.

Diarrhées

- Prenez sans tarder du Lopéramide (p.ex. Imodium®) selon prescription.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Buvez environ 2 litres par jour (p.ex. eau, thé, bouillon).

Inflammation de la muqueuse buccale

- Rincez la bouche au minimum après chaque repas avec de l'eau ou de l'eau salée (1/2 -1 c à t./litre d'eau). Sans amélioration et si vous avez de la peine à boire ou à manger, contactez votre équipe soignante.

Maux de tête

- Demandez à votre médecin quels médicaments sont autorisés. Ne prenez pas de médicaments à base de paracétamol sans le consulter.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante?

- En cas de fièvre supérieure à 38°C.
- En cas de coloration jaunâtre de la peau ou du blanc des yeux et d'urine foncée inhabituelle.
- En cas de grande fatigue croissante
- En cas de forts maux de tête persistants et/ou de vision trouble
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez. Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.