

Information pour les patients

Sutent® (Sunitinib)

Sutent® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Sutent®?



Sutent® capsules à 12,5 mg, 25 mg et 50 mg.

Capsules à 12,5 mg: partie supérieure et inférieure orange, marquées sur la partie inférieure avec «STN 12,5 mg».

Capsules à 25 mg: partie supérieure caramel et inférieure orange, marquées sur la partie inférieure avec «STN 25 mg».

Capsules à 50 mg: partie supérieure et inférieure caramel, marquées sur la partie inférieure avec «STN 50 mg».

Comment conserver Sutent®?

Entreposez le médicament à l'air ambiant.

A quelle dose Sutent® doit être utilisé?

Prenez les capsules à la dose prescrite par votre médecin.

Comment dois-je prendre Sutent®?

- Prenez les capsules en une prise par jour avec un verre d'eau, de préférence toujours à la même heure.
- Prenez les capsules à jeun ou avec un repas léger et pauvre en graisses.
- Ne prenez jamais deux doses journalières le même jour.
- Avalez les capsules en entier. Ne pas mâcher, casser, ouvrir ou écraser les capsules.

Qu'est-ce que je fais si...

... j'ai oublié le médicament?

- Ne prenez pas la dose manquée par la suite plus tard le même jour. Prenez la prochaine dose à l'heure habituelle du jour suivant.
- Ne prenez jamais deux doses journalières le même jour.
- Notez cette date.

... j'ai vomi le médicament?

- Ne prenez pas de nouvelles capsules.
- Continuez le traitement le lendemain sans changement.

... j'ai pris trop de comprimés?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents ? Que puis-je faire ?

Saignements (nez, gencives)

- Contactez votre équipe soignante.

Éruptions cutanées

- Suivez les instructions pour les soins de peau données par votre équipe soignante.
- N'utilisez aucun produit sans avoir consulté votre équipe soignante.

Nausées, vomissements, perte d'appétit

- Prenez le médicament prescrit sans attendre.

Diarrhées

- Prenez sans tarder du Lopéramide (p.ex. Imodium®) selon prescription.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Buvez environ 2 litres par jour (p.ex. eau, thé, bouillon).

Inflammation de la muqueuse buccale

- Rincez la bouche au minimum après chaque repas avec de l'eau ou de l'eau salée (1/2 -1 c à t./litre d'eau).
- Sans amélioration et si vous avez de la peine à boire ou à manger, contactez votre équipe soignante.

Augmentation de la tension artérielle

- Contrôlez votre tension artérielle au moins une fois par semaine.
En cas de valeurs supérieures à 145/85 contactez votre médecin.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante?

- Si votre diarrhée ne peut être stoppée avec la prise de Lopéramide (p.ex. Imodium®) à la dose prescrite, soit avec un maximum de 8 gélules/comprimés par jour.
- En cas de fièvre supérieure à 38°C.
- En cas de forte et croissante fatigue.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez. Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir?

- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.
- Pendant le traitement, vous ne devez pas absorber de préparation à base de pamplemousse ou de millepertuis. Ces produits peuvent interférer avec l'effet du médicament. Abstenez-vous donc de consommer ces produits pendant le traitement.

Personnes de contact

Médecin

Infirmières

Pharmacie

Urgences

Remarques

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.

Version: Juillet 2015

Référence: www.swissmedicinfo.ch

© Société Suisse d'Oncologie Médicale/Soins en Oncologie Suisse