



Information pour les patients

TUKYSA® (Tucatinib)

TUKYSA® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente TUKYSA® ?



TUKYSA® comprimés à 50 et 150 mg.

Comprimés à 50 mg : ronds, jaune, marqués d'un côté avec «TUC» et de l'autre avec «50».

Comprimés à 150 mg : ovales, jaune, marqués d'un côté avec «TUC» et de l'autre avec «150».

Comment conserver TUKYSA® ?

Conserver le médicament à température ambiante.

À quelle dose TUKYSA® doit-il être utilisé ?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre TUKYSA® ?

- Prenez les comprimés matin et soir (2 fois /jour) si possible à la même heure, avec un verre d'eau.
- Vous pouvez prendre les comprimés avec ou sans nourriture.
- Avalez les comprimés entiers. Ne pas les mâcher, ni les casser ou les écraser.

Qu'est-ce que je fais si...

...j'ai oublié le médicament ?

- Ne prenez pas la dose oubliée par la suite le même jour.
- Prenez la prochaine dose à l'heure habituelle.
- Notez la date de l'oubli.

...j'ai vomi le médicament ?

- Ne prenez pas de nouveaux comprimés avant la prochaine dose prévue.
- Continuez le traitement sans changement à l'heure prévue.

...j'ai pris trop de comprimés /capsules ?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents ?

Que puis-je faire ?

Diarrhées

- Prenez sans tarder du Lopéramide (p.ex. Imodium®) selon prescription.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Buvez environ 2 litres par jour (p.ex. eau, thé, bouillon).

Nausées, vomissements

- Prenez les médicaments prescrits sans attendre.
- Si vous n'obtenez aucune amélioration dans les 24 heures, contactez votre médecin.

Inflammation de la muqueuse buccale

- Rincez la bouche au minimum après chaque repas avec de l'eau ou de l'eau salée (1/2 -1 c à t./litre d'eau).
- Sans amélioration et si vous avez de la peine à boire ou à manger, contactez votre équipe de traitement.

Douleurs articulaires

- Les antidouleurs habituels en vente libre (par exemple le paracétamol) sont autorisés.

Rougeurs, cloques et douleur dans les mains et les plantes des pieds

- Dès le début du traitement, frotter la paume de vos mains et la plante de vos pieds avec une crème ou une lotion grasse, évent. à base d'urée.
- Évitez les températures extrêmes (p.ex. ne laissez pas les mains longtemps dans l'eau chaude).
- Évitez les excès de pression (p.ex. les chaussures serrées).
- En cas de douleur et d'apparition d'ampoules, stoppez le traitement et prenez immédiatement contact avec votre médecin.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets indésirables peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante ?

- Si la diarrhée ne peut être stoppée avec la prise de Loperamide (par ex. Imodium®) à la dose prescrite, soit avec un maximum de 8 gélules/comprimés par jour.
- Si vous avez des aphtes dans la bouche ou des difficultés à avaler.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou d'autres troubles inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez. Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir ?

- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.
- Vous ne devez pas prendre de préparations à base de millepertuis pendant le traitement. Ces produits peuvent interférer avec l'effet du médicament. Par conséquent, veuillez à ne pas consommer ces produits pendant le traitement.

Personnes de contact

Médecin

Infirmier/ère

Pharmacie

Urgences

Remarques

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.

Version : juin 2022
Référence : www.swissmedicinfo.ch (2022)

© L'association Anticancéreux par voie orale www.anticancereuxoraux.ch

Soutenu par

 Onkologieflege Schweiz
Soins en Oncologie Suisse
Cure Oncologica Svizzera

 SSMO
SSOM
SGMO