

Come si conserva Tarceva®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Tarceva®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Tarceva®?

- Assuma l'intera dose giornaliera che Le è stata prescritta dal medico una volta al giorno, lontano dai pasti (almeno un'ora prima o due ore dopo).
- Le compresse devono essere assunte intere, con abbondante acqua, senza essere né masticate né succhiate e neppure triturate.

Che cosa faccio se ...

... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Assuma la dose dimenticata il più presto possibile, ma in ogni caso ancora il giorno stesso.
- Il giorno successivo, assumi la dose giornaliera che Le è stata prescritta dal medico all'ora abituale.
- NON assumi MAI la dose giornaliera prescritta due volte nello stesso giorno.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.

... ho vomitato il farmaco?

- NON assumi il farmaco un'altra volta. Attendi il giorno successivo per proseguire con la terapia come d'abitudine.

... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Avverti immediatamente la Sua équipe curante.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

Che cosa posso fare per contrastarli?

Eruzioni e/o arrossamenti cutanei

- Curi la pelle come consigliato.
- Se ritiene opportuno l'uso di altri prodotti, lo concordi con l'équipe curante.

Diarrea

- Assumi tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Cerchi di bere almeno 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

Congiuntivite

- Umidifichi gli occhi più volte al giorno con un collirio. All'aperto indossi gli occhiali da sole. Per alleviare eventuali sintomi d'inflammatione o il prurito applichi impacchi freddi sulle palpebre.

Inflammatione delle mucose orali

- Risciacqui la bocca con acqua o acqua salata più volte al giorno e dopo ogni pasto (1/2-1 cucchiaino per 1 litro d'acqua).
- Contatti l'équipe curante qualora l'inflammatione non regredisce e/o Le impedisce di bere e di mangiare.

Nausea/vomito

- Assumi tempestivamente i farmaci contro la nausea e il vomito (antiemetici) che Le sono stati prescritti.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Febbre oltre i 38 °C
- Affanno respiratorio e/o palpitazioni
- Diarrea persistente malgrado la somministrazione della dose massima (8 capsule al giorno) normalmente consentita della sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®)
- Altri disturbi persistenti o di origine sconosciuta

Il Suo medico deve sapere quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.

Che cos'altro devo sapere?

- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.
- Il pompelmo e l'erba di San Giovanni (iperico) sono controindicati durante la terapia con Tarceva®. Si astenga pertanto dal consumo di tali sostanze.
- Anche i farmaci contro il bruciore di stomaco (gastroprotettori) possono ridurre l'efficacia di Tarceva®. Assumi pertanto solo gastroprotettori prescritti dal Suo medico.
- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.