

Informazioni riassuntive per il paziente

Tarceva® (Erlotinib)

Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale Tarceva®.
Le seguenti informazioni Le consentiranno di ottenere effetti ottimali dalla terapia.

Che aspetto ha Tarceva®?



Tarceva® è disponibile in compresse rivestite rigide, contenenti 25 mg, 100 mg o 150 mg di principio attivo.

Le compresse da 25 mg sono rotonde e di colore bianco giallognolo. Su un lato riportano la scritta «Tarceva 25» e un logo.

Le compresse da 100 mg sono rotonde e di colore bianco giallognolo. Su un lato riportano la scritta «Tarceva 100» e un logo.

Le compresse da 150 mg sono rotonde e di colore bianco giallognolo. Su un lato riportano la scritta «Tarceva 150» e un logo.

Come si conserva Tarceva®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Tarceva®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Tarceva®?

- Assuma l'intera dose giornaliera che Le è stata prescritta dal medico una volta al giorno, lontano dai pasti (almeno un'ora prima o due ore dopo).
- Le compresse devono essere assunte intere, con abbondante acqua, senza essere né masticate né succhiate e neppure triturate.

Che cosa faccio se ...

... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Assuma la dose dimenticata il più presto possibile, ma in ogni caso ancora il giorno stesso.
- Il giorno successivo, assumi la dose giornaliera che Le è stata prescritta dal medico all'ora abituale.
- NON assumi MAI la dose giornaliera prescritta due volte nello stesso giorno.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.

... ho vomitato il farmaco?

- NON assumi il farmaco un'altra volta. Attendi il giorno successivo per proseguire con la terapia come d'abitudine.

... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Avverta immediatamente la Sua équipe curante.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti? Che cosa posso fare per contrastarli?

Eruzioni e/o arrossamenti cutanei

- Curi la pelle come consigliato.
- Se ritiene opportuno l'uso di altri prodotti, lo concordi con l'équipe curante.

Diarrea

- Assumi tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Cerchi di bere almeno 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

