

Informazioni riassuntive per il paziente

Tasigna® (Nilotinib)

Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale Tasigna®.
Le seguenti informazioni Le consentiranno di aderire in modo ottimale alla terapia.

Che aspetto ha Tasigna®?



Tasigna® è disponibile in capsule rigide da 150 mg e da 200 mg.

La capsula da 150 mg è di colore giallo chiaro con le diciture “NVR/TKI” contrassegnate in inchiostro nero.

La capsula da 200 mg è di colore giallo chiaro con le diciture “NVR/TKI” contrassegnate in inchiostro rosso.

Come si conserva Tasigna®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Tasigna®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Tasigna®?

- Assuma la dose prescritta 2 volte al giorno, all'incirca ogni 12 ore.
- Assuma le compresse a digiuno, almeno 1 ora prima o 2 ore dopo il pasto con un bicchiere d'acqua.
- Deglutisca le capsule intere con acqua, non devono essere aperte, sciolte, spezzate o masticate.

Che cosa faccio se ...

... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Non assuma più tardi la dose dimenticata. Proseguo la terapia il giorno successivo, attenendosi al consueto orario di somministrazione.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.

... ho vomitato il farmaco?

- Non assuma il farmaco un'altra volta.
- Proseguo la terapia il giorno successivo, attenendosi al consueto orario di somministrazione.

... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

Che cosa posso fare per contrastarli?

Febbre, brividi, gola infiammata

- Contatti l'équipe curante.

Sanguinamenti (naso, gengive)

- Contatti l'équipe curante.

Nausea/vomito/inappetenzza

- Assuma tempestivamente i farmaci che Le sono stati prescritti contro tali effetti secondari.

Diarrea

- Assuma tempestivamente le sostanze prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Consigliamo di bere circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

Stitichezza

- In caso di stitichezza persistente chieda alla Sua équipe curante di indicarle un lassativo idoneo.

Eruzioni cutanee e prurito

- Curi la pelle come consigliato dall'équipe curante.
- Non faccia uso di prodotti per la cute non espressamente consentiti dall'équipe curante.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Difficoltà a respirare e/o palpitazioni.
- Diarrea persistente malgrado la somministrazione della dose massima (8 capsule al giorno) della sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium).
- Alterazioni cutanee (eruzioni, arrossamento, prurito).
- Disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.

Che cos'altro devo sapere?

- Il pompelmo e l'erba di San Giovanni (o iperico) possono ridurre l'efficacia del farmaco. Si astenga pertanto dal consumo di tali sostanze durante la terapia con Tasigna®.
- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.