

Information pour les patients

Temodal® (Temozolomide)

Temodal® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Temodal®?



Temodal® capsules dures à 5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg et 250 mg.
Capsules dures à 5 mg: Partie inférieure blanc opaque, partie supérieure vert opaque, marquées sur le dessus avec «Temodal» et en dessous avec «5 mg».
Capsules dures à 20 mg: Partie inférieure blanc opaque, partie supérieure jaune opaque, marquées sur le dessus avec «Temodal» et en dessous avec «20 mg».
Capsules dures à 100 mg: Partie inférieure blanc opaque, partie supérieure rose opaque, marquées sur le dessus avec «Temodal» et en dessous avec «100 mg».
Capsules dures à 140 mg: Partie inférieure blanc opaque, partie supérieure bleu, marqué sur le dessus avec «Temodal» et en dessous avec «140 mg».
Capsules dures à 180 mg: Partie inférieure blanc opaque, partie supérieure orange opaque, marqué sur le dessus avec «Temodal» et en dessous avec «180 mg».
Capsules dures à 250 mg: Partie inférieure et supérieure blanc opaque, marquées sur le dessus avec «Temodal» et en dessous avec «250 mg».

Comment conserver Temodal®?

Entreposez le médicament à l'air ambiant.

A quelle dose Temodal® doit être utilisé?

Prenez les capsules dures à la dose prescrite par votre médecin.

Comment dois-je prendre Temodal®?

- Vous devez prendre toutes les capsules dures le matin, à la dose quotidienne prescrite en une seule fois et à jeun, soit au moins 1 heure avant ou 2 heures après un repas.
- Avalez les capsules dures en entier. Ne pas mâcher, casser, ouvrir ou écraser les capsules.
- Si vous souffrez de nausées ou vomissements importants, prenez le médicament le soir avant le coucher.

Qu'est-ce que je fais si...

...j'ai oublié le médicament?

- Prenez la dose manquée par la suite le même jour. Prendre la prochaine dose à l'heure habituelle du jour suivant.
- Ne prenez jamais deux doses journalières le même jour.
- Notez cette date.

...j'ai vomi le médicament?

- Ne prenez pas de nouvelles capsules dures le même jour.
- Continuez le traitement le lendemain sans changement.

... j'ai pris trop de capsules?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents ? Que puis-je faire ?

Nausées, vomissements

- Prenez les médicaments prescrits sans attendre.
- En cas de nausées ou vomissements sévères, prenez le médicament prescrit le soir ou avant le coucher.

