

Personnes de contact

Médecin

Infirmières

Pharmacie

Urgences

Remarques

Information pour les patients

Temozolomide Teva®

Temozolomide Teva® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Temozolomide Teva®?



Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.

Version: Décembre 2013

Référence: www.swissmedicinfo.ch

© Société Suisse d'Oncologie Médicale/Soins en Oncologie Suisse

Temozolomide Teva® capsules dures à 5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg et 250 mg.

Capsules dures à 5 mg: Capsules dures blanc opaque, avec 2 traits verts, marquées avec «5 mg» et «T».

Capsules dures à 20 mg: Capsules dures blanc opaque, avec 2 traits orange, marquées sur le dessus avec «20 mg» et «T».

Capsules dures à 100 mg: Capsules dures blanc opaque, avec 2 traits rose, marquées sur le dessus avec «100 mg» et «T».

Capsules dures à 140 mg: Capsules dures blanc opaque, avec 2 traits bleu, marquées sur le dessus avec «140 mg» et «T».

Capsules dures à 180 mg: Capsules dures blanc opaque, avec 2 traits rouge, marquées sur le dessus avec «180 mg» et «T».

Capsules dures à 250 mg: Capsules dures blanc opaque, avec 2 traits noirs, marquées sur le dessus avec «250 mg» et «T».

Comment conserver Temozolomide Teva®?

Entreposez le médicament à l'air ambiant.

A quelle dose Temozolomide Teva® doit être utilisé?

Prenez les capsules dures à la dose prescrite par votre médecin.

Comment dois-je prendre Temozolomide Teva®?

- Vous devez prendre toutes les capsules dures le matin, à la dose quotidienne prescrite en une seule fois et à jeun, soit au moins 1 heure avant ou 2 heures après un repas.
- Avalez les capsules dures en entier. Ne pas mâcher, casser, ouvrir ou écraser les capsules.
- Si vous souffrez de nausées ou vomissements importants, prenez le médicament le soir avant le coucher.

Qu'est-ce que je fais si...

...j'ai oublié le médicament?

- Prenez la dose manquée par la suite le même jour. Prendre la prochaine dose à l'heure habituelle du jour suivant.
- Ne prenez jamais deux doses journalières le même jour.
- Notez cette date.

...j'ai vomi le médicament?

- Ne prenez pas de nouvelles capsules dures le même jour.
- Continuez le traitement le lendemain sans changement.

...j'ai pris trop de capsules?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents?

Que puis-je faire?

Nausées, vomissements

- Prenez les médicaments prescrits sans attendre.
- En cas de nausées ou vomissements sévères, prenez le médicament prescrit le soir ou avant le coucher.

Constipation

- Si les symptômes persistent, consultez votre équipe soignante pour un laxatif approprié.

Chute de cheveux

- Faites-vous conseiller par votre équipe soignante pour une perruque ou d'autres moyens adaptés.

Maux de tête

- Prenez contact avec votre équipe soignante.

Eruptions cutanées

- Suivez les instructions pour les soins de peau données par votre équipe soignante.
- N'utilisez aucun produit sans avoir consulté votre équipe soignante.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante?

- En cas de fièvre supérieure à 38°C.
- En cas de signes de saignement sur la peau ou des muqueuses.
- Si vous souffrez de nausées et/ou des vomissements persistants.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez. Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir?

- Les patients sont souvent fatigués sous Temozolomide Teva®, l'aptitude à conduire ou faire fonctionner des machines dangereuses peut être limitée.
- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.