

Comment conserver Tepmetko® ?

Conserver le médicament à température ambiante.

À quelle dose Tepmetko® doit-il être utilisé ?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Tepmetko® ?

- Prenez les comprimés pelliculés en une prise par jour.
- Prenez les comprimés avec de la nourriture.
- Avalez les comprimés entiers, sans les diviser, ni les mâcher ou les écraser.
- En cas de difficulté pour avaler : dissolvez les comprimés entiers dans un demi-verre d'eau non gazeuse en remuant avec une cuillère jusqu'à ce qu'ils soient complètement dissous et avaler immédiatement. Rincer le verre avec de l'eau et boire également cette eau.

Qu'est-ce que je fais si...

...j'ai oublié le médicament ?

- Prenez la dose oubliée le jour même, sauf si la prochaine prise se situe dans les 8 heures suivantes.
- Notez la date de l'oubli.

...j'ai vomi le médicament ?

- Ne prenez pas de nouveaux comprimés.
- Prenez la dose suivante le lendemain sans changement à l'heure prévue.

...j'ai pris trop de comprimés ?

- Contactez votre équipe de traitement pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents ?

Que puis-je faire ?

Œdèmes

- Gonflements dus à la rétention de liquide corporel - souvent autour des yeux et des chevilles et prise de poids rapide).
- Contactez votre équipe de traitement.

Nausées/vomissements

- Prenez les médicaments prescrits sans attendre pour y remédier.
- Si vous n'obtenez aucune amélioration dans les 24 heures, contactez votre équipe de traitement.

Perte d'appétit et perte de poids

- Il peut être utile de consommer plusieurs petites portions et de choisir de préférence des aliments qui vous font plaisir.
- Contactez votre équipe de traitement si la perte d'appétit se prolonge.

Diarrhées

- Prenez sans tarder du Lopéramide (p.ex. Imodium®) selon prescription.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Veillez à boire au moins 2 litres par jour (p. ex. de l'eau, du thé, du bouillon).
- Si aucune amélioration n'est constatée dans les 24 heures, prenez contact avec votre équipe de traitement.

Fatigue

- Soyez prudent, en cas de fatigue prononcée, lors de la conduite de véhicules et de l'utilisation de machines dangereuses.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets indésirables peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe de traitement ?

- Si vous souffrez de toux et de difficultés respiratoires.
- Si vous souffrez de nausées et/ou de vomissements persistants.
- En cas de fatigue intense et croissante.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou d'autres troubles inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez.

Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir ?

- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.
- Vous ne devez pas prendre de préparations à base de pamplemousse ou de millepertuis pendant le traitement. Ces produits peuvent interférer avec l'effet du médicament. Veillez donc à ne pas consommer ces produits pendant le traitement.