

## Was muss ich sonst noch wissen?

- Unterbrechen Sie die Behandlung nicht ohne Rücksprache mit Ihrer Ärztin/ Ihrem Arzt.
- Sie dürfen während der Behandlung keine Grapefruit- oder Johanniskraut (oder andere) Präparate einnehmen. Diese Produkte können die Wirkung des Medikamentes stören. Verzichten Sie deshalb während der Behandlung auf diese Produkte.

## Kontaktpersonen

Ärztin/Arzt \_\_\_\_\_

Pflegefachperson \_\_\_\_\_

Apotheke \_\_\_\_\_

Notfall \_\_\_\_\_

## Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

Dieses von Fachleuten zusammengestellte Merkblatt soll den Betroffenen und ihren Angehörigen den Umgang mit dem Medikament erleichtern. Es ist eine Ergänzung zur Packungsbeilage und Fachinformation.

Version: August 2024  
Referenz: [www.swissmedicinfo.ch](http://www.swissmedicinfo.ch) (2024)

©Verein Orale Tumortherapie [www.oraletumortherapie.ch](http://www.oraletumortherapie.ch)

Unterstützt durch



Orale Tumor Therapie  
AntiCancereux Oraux  
Terapie Orali in Oncologia  
.ch

## Merkblatt für Patientinnen und Patienten

# Truqap® (Capivasertib)

Sie beginnen eine Therapie mit Truqap® und können diese positiv beeinflussen, wenn Sie die nachfolgenden Informationen beachten.

## Wie sieht Truqap® aus?



Truqap® Filmtabletten à 160mg und 200mg auf einer Seite mit «CAV» 160 gekennzeichnet.  
Truqap® 200mg: ovale, beigefarbene Filmtabletten auf einer Seite mit «CAV» 200 gekennzeichnet.

## Wie muss Truqap® aufbewahrt werden?

Bewahren Sie das Medikament bei Raumtemperatur auf.

## Wie ist die Dosierung von Truqap®?

Nehmen Sie die Tabletten in der Dosierung gemäss Verordnung Ihrer Ärztin/Ihres Arztes ein.

## Wie nehme ich Truqap® ein?

- Nehmen Sie die Filmtabletten am Morgen und am Abend (2x pro Tag) mit einem Glas Wasser ein. Der zeitliche Abstand sollte etwa 12 Stunden betragen.
- Nehmen Sie Truqap® vier Tage in Folge ein, danach folgt eine Pause von drei Tagen.
- Nehmen Sie Truqap® mit oder ohne Nahrung ein.
- Schlucken Sie die Tabletten ganz. Die Tabletten nicht teilen, nicht kauen, nicht mörsern.

## Was mache ich, wenn ich...

### ... das Medikament vergessen habe?

- Die ausgelassene Dosis können Sie nachträglich, bis zu 4 Stunden nach dem geplanten Zeitpunkt, einnehmen.
- Notieren Sie sich das Datum.
- Nehmen Sie die nächste Dosis zur gewohnten Zeit. Zwischen den Einnahmen sollte ein Abstand von 8 Stunden eingehalten werden.
- Nehmen Sie keine doppelte Dosis auf einmal ein.

### ... das Medikament erbrechen musste?

- Nehmen Sie keine zusätzliche Dosis ein.
- Nehmen Sie die nächste Dosis von Truqap® zur gewohnten Zeit ein.

### ... zu viele Kapseln eingenommen habe?

- Kontaktieren Sie umgehend das Behandlungsteam, damit das weitere Vorgehen festgelegt werden kann.

## Welche Nebenwirkungen sind häufig?

### Was kann ich dagegen tun?

#### Durchfall

- Falls vom Arzt verordnet nehmen Sie frühzeitig Loperamid (z.B. Imodium®) nach Vorschrift ein.
- Versuchen Sie bei leichtem Durchfall eine Ernährungsanpassung mit Reis, Bananen und weissem Brot.

- Achten Sie darauf, dass Sie etwa 2 Liter pro Tag trinken (z.B. Wasser, Tee, Bouillon).
- Wenn keine Besserung innerhalb von 24 Stunden eintritt, nehmen Sie mit Ihrem Behandlungsteam Kontakt auf.

#### Entzündung der Mundschleimhaut

- Mehrmals täglich, mindestens nach jeder Mahlzeit, den Mund mit Wasser oder Salzwasser (½ – 1 Teelöffel/Liter Wasser) spülen.
- Falls keine Besserung eintritt und die Flüssigkeits- und Nahrungsaufnahme behindert ist, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Behandlungsteam auf.

#### Übelkeit / Erbrechen

- Nehmen Sie die dagegen verordneten Medikamente frühzeitig ein.
- Wenn keine Besserung innerhalb von 24 Stunden eintritt, nehmen Sie mit Ihrem Behandlungsteam Kontakt auf.

#### Hautausschlag

- Führen Sie die Hautpflege gemäss Anweisung des Behandlungsteams durch.
- Benutzen Sie keine Produkte ohne vorgängige Rücksprache mit Ihrem Behandlungsteam.

#### Kopfschmerzen

- Die üblichen freiverkäuflichen Schmerzmittel (z.B. Paracetamol) sind erlaubt.

#### Müdigkeit

- Bei ausgeprägter Müdigkeit ist beim Lenken von Fahrzeugen und Bedienen gefährlicher Maschinen Vorsicht geboten.

In Kombination mit anderen Medikamenten könnten weitere Nebenwirkungen auftreten.

## Wann muss ich mein Behandlungsteam informieren?

- Wenn neue, anhaltende oder andere unklare Beschwerden auftreten.
- Bei Auftreten von übermässigem Durst, häufigem Wasserlassen/grösseren Harnmengen und/oder gesteigertem Appetit mit Gewichtsverlust.

**Ihre Ärztin/Ihr Arzt muss wissen, welche Medikamente oder Präparate (auch pflanzliche) Sie einnehmen. Bringen Sie beim nächsten Arztbesuch eine Liste mit.**