

## Che cos'altro devo sapere?

- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.
- Il pompelmo e l'erba di San Giovanni (iperico) -o altri rimedi- sono controindicati durante la terapia con Truqap®, possono ridurre l'efficacia del farmaco. Si astenga pertanto dal consumo di tali sostanze durante la terapia con Truqap®.

## Contatti

Medico

---

Personale infermieristico

---

Farmacista

---

Pronto soccorso

---

## Appunti

---

---

---

---

---

---

---

---

Con queste informazioni sintetiche, l'équipe curante intende facilitare la somministrazione della terapia orale ai pazienti oncologici e ai familiari curanti. La presente scheda informativa vuole essere un complemento al foglietto illustrativo e alle informazioni fornite dagli specialisti.

Versione: ottobre 2024

Fonte di riferimento: [www.swissmedicinfo.ch](http://www.swissmedicinfo.ch)

© L'associazione Terapia orale dei tumori [www.terapieorallinoncologia.ch](http://www.terapieorallinoncologia.ch)

Supportato da

 Onkologiepflege Schweiz  
Soins en Oncologie Suisse  
Cure Oncologique Svizzera

 SSMO  
SSOM  
SGMO



Orale Tumor Therapie  
Anti Cancerux Oraux  
Therapie Orali in Oncologia  
.ch

## Informazioni riassuntive per il paziente

## Truqap® (Capiivasertib)

Sta per iniziare una terapia con Truqap® potrà ottenere maggiori benefici se terrà conto delle seguenti raccomandazioni.

## Che aspetto ha Truqap®?



Truqap® è disponibile in compresse rivestite con film da 160 mg e 200 mg.  
Truqap® compresse da 160mg: rotonde, di colore beige con impresso «CAV 160» su un lato.  
Truqap® compresse da 200mg: ovali, di colore beige con impresso «CAV 200» su un lato.

## Come si conserva Truqap®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

## Come si dosa Truqap®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

## Come si somministra Truqap®?

- Assuma la dose prescritta mattina e sera (2 volte al giorno) con un bicchiere d'acqua, con un intervallo di tempo di circa 12 ore.
- Assuma Truqap® per quattro giorni consecutivi, seguiti da una pausa di tre giorni.
- Assuma Truqap® in concomitanza o meno dei pasti.
- Non divida o trituri le compresse, ma le deglutisca intere, senza masticarle.

## Che cosa faccio se ...

### ... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Assuma la dose dimenticata il più presto possibile, ma al più tardi quattro ore dopo l'ora prevista.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.
- Prenda la dose successiva alla solita ora. L'intervallo tra le dosi deve essere di 8 ore.
- Non assuma la dose doppia in una sola volta.

### ... ho vomitato il farmaco?

- Non assuma una dose supplementare.
- Prenda la dose successiva di Truqap alla solita ora.

### ... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

## Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

### Che cosa posso fare per contrastarli?

#### Diarrea

- Se prescritta dal medico, assuma tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Beva circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).
- Contatti l'équipe curante qualora la diarrea perdurasse oltre 24 ore.

## Inflammatione delle mucose orali

- Risciacqui la bocca con acqua o acqua salata dopo ogni pasto e, se possibile, anche tra i pasti (½-1 cucchiaino da tè di sale per 1 litro di acqua).
- Contatti l'équipe curante qualora l'inflammatione non regredisce e/o Le impedisse di bere e di mangiare.

## Nausea/vomito

- Assuma tempestivamente i farmaci contro la nausea e il vomito che Le sono stati prescritti.
- Contatti l'équipe curante qualora la nausea e il vomito perdurassero oltre 24 ore.

## Eruzioni cutanee

- Curi la pelle come consigliato dall'équipe curante.
- Non usi prodotti per la cura della pelle senza prima aver consultato l'équipe curante.

## Mal di testa

- Sono consentiti gli antidolorifici di uso corrente, non soggetti a prescrizione medica (p. es. paracetamolo).

## Stanchezza

- In caso di sonnolenza pronunciata, è richiesta cautela nella guida di veicoli e nell'utilizzo di macchinari pericolosi.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

## Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Altri nuovi disturbi persistenti o di origine sconosciuta.
- Sete eccessiva, minzione frequente / maggiore quantità di urina e/o aumento dell'appetito con perdita di peso.

## Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.

- Possono verificarsi interazioni con altri medicinali e preparati (compresi quelli a base di erbe).