

Contatti

Medico

Personale infermieristico

Farmacista

Pronto soccorso

Appunti

Con queste informazioni sintetiche, l'équipe curante intende facilitare la somministrazione della terapia orale ai pazienti oncologici e ai familiari curanti. La presente scheda informativa vuole essere un complemento al foglietto illustrativo e alle informazioni fornite dagli specialisti.

Versione: Giugno 2022

Fonte di riferimento: www.swissmedicinfo.ch (2022)

© L'associazione Terapia orale dei tumori www.terapieorallinoncologia.ch

Supportato da

 Onkologiepflege Schweiz
Soins en Oncologie Suisse
Cure Oncologique Svizzera

 SSMO
SSOM
SGMO



Orale Tumor Therapie
Anti Cancerieux Oraux
Terapie Orali in Oncologia
.ch

Informazioni riassuntive per il paziente

TUKYSA® (Tucatinib)

Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale TUKYSA®. Le seguenti informazioni Le consentiranno di aderire in modo ottimale alla terapia.

Che aspetto ha TUKYSA®?



TUKYSA® è disponibile in compresse da 50 mg e 150 mg.
Compresses da 50 mg: rotonde, gialle, con impresso «TUC» su un lato e «50» sull'altro.
Compresses da 150 mg: ovali, gialle, con impresso «TUC» su un lato e «150» sull'altro.

Come si conserva TUKYSA®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa TUKYSA®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra TUKYSA®?

- Assuma la dose prescritta mattina e sera (2 volte/giorno), se possibile, sempre alla stessa ora, con un bicchiere d'acqua.
- Può assumere le compresse in concomitanza o meno dei pasti.
- Non divida o trituri le compresse, ma le deglutisca intere, senza masticarle.

Che cosa faccio se ...

... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Non assuma più tardi la dose dimenticata.
- Proseguo la terapia come d'abitudine assumendo il farmaco all'ora prestabilita.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.

... ho vomitato il farmaco?

- Non assuma il farmaco un'altra volta.
- Proseguo la terapia all'ora prestabilita.

... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

Che cosa posso fare per contrastarli?

Diarrea

- Assuma tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Beva circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

Nausea/vomito

- Assuma tempestivamente i farmaci contro la nausea e il vomito che Le sono stati prescritti.
- Contatti il Suo medico qualora la nausea e il vomito perdurassero oltre 24 ore.

Infiammazione delle mucose orali

- Risciacqui la bocca con acqua o acqua salata più volte al giorno e dopo ogni pasto (1/2–1 cucchiaino per 1 litro d'acqua).
- Contatti l'équipe curante qualora l'infiammazione non regredisce e/o Le impedisse di bere e di mangiare.

Dolori articolari

- Sono consentiti gli antidolorifici di uso corrente, non soggetti a prescrizione medica (p. es. paracetamolo).

Arrossamenti, vescicole e dolori ai palmi delle mani e dei piedi

- Applichi fin dall'inizio della terapia una crema o una lozione grassa, idratante (contenenti urea) sulle mani e sui piedi.
- Eviti temperature estreme (p. es. il contatto prolungato con acqua calda).
- Eviti forti pressioni (p. es. scarpe strette).
- Informi l'équipe curante in presenza di dolori e vescicole.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Diarrea persistente malgrado la somministrazione della dose massima (8 capsule/compresses al giorno) della sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®).
- Infiammazioni e/o lacerazioni del cavo orale o difficoltà a deglutire.
- Altri disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.

Che cos'altro devo sapere?

- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.
- L'erba di San Giovanni (o iperico) è controindicata durante la terapia con TUKYSA®, può ridurre l'efficacia del farmaco. Si astenga pertanto dal consumo di tali sostanze durante la terapia con TUKYSA®.