



Informazioni riassuntive per il paziente

TUKYSA® (Tucatinib)

Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale TUKYSA®. Le seguenti informazioni Le consentiranno di aderire in modo ottimale alla terapia.

Che aspetto ha TUKYSA®?



TUKYSA® è disponibile in compresse da 50 mg e 150 mg.
Compresses da 50 mg: rotonde, gialle, con impresso «TUC» su un lato e «50» sull'altro.

Compresses da 150 mg: ovali, gialle, con impresso «TUC» su un lato e «150» sull'altro.

Come si conserva TUKYSA®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa TUKYSA®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra TUKYSA®?

- Assuma la dose prescritta mattina e sera (2 volte/giorno), se possibile, sempre alla stessa ora, con un bicchiere d'acqua.
- Può assumere le compresse in concomitanza o meno dei pasti.
- Non divida o trituri le compresse, ma le deglutisca intere, senza masticarle.

Che cosa faccio se ...

... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Non assuma più tardi la dose dimenticata.
- Proseguo la terapia come d'abitudine assumendo il farmaco all'ora prestabilita.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.

... ho vomitato il farmaco?

- Non assumo il farmaco un'altra volta.
- Proseguo la terapia all'ora prestabilita.

... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

Che cosa posso fare per contrastarli?

Diarrea

- Assuma tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Beva circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

Nausea/vomito

- Assuma tempestivamente i farmaci contro la nausea e il vomito che Le sono stati prescritti.
- Contatti il Suo medico qualora la nausea e il vomito perdurassero oltre 24 ore.

Infiammazione delle mucose orali

- Risciacqui la bocca con acqua o acqua salata più volte al giorno e dopo ogni pasto (1/2–1 cucchiaino per 1 litro d’acqua).
- Contatti l’équipe curante qualora l’infiammazione non regredisce e/o Le impedisse di bere e di mangiare.

Dolori articolari

- Sono consentiti gli antidolorifici di uso corrente, non soggetti a prescrizione medica (p. es. paracetamolo).

Arrossamenti, vescicole e dolori ai palmi delle mani e dei piedi

- Applichi fin dall’inizio della terapia una crema o una lozione grassa, idratante (contenenti urea) sulle mani e sui piedi.
- Eviti temperature estreme (p. es. il contatto prolungato con acqua calda).
- Eviti forti pressioni (p. es. scarpe strette).
- Informi l’équipe curante in presenza di dolori e vescicole.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all’équipe curante?

- Diarrea persistente malgrado la somministrazione della dose massima (8 capsule/comprese al giorno) della sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®).
- Infiammazioni e/o lacerazioni del cavo orale o difficoltà a deglutire.
- Altri disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.

Che cos’altro devo sapere?

- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.
- L’erba di San Giovanni (o iperico) è controindicata durante la terapia con TUKYSA®, può ridurre l’efficacia del farmaco. Si astenga pertanto dal consumo di tali sostanze durante la terapia con TUKYSA®.

Contatti

Medico

Personale infermieristico

Farmacista

Pronto soccorso

Appunti

Con queste informazioni sintetiche, l’équipe curante intende facilitare la somministrazione della terapia orale ai pazienti oncologici e ai familiari curanti. La presente scheda informativa vuole essere un complemento al foglietto illustrativo e alle informazioni fornite dagli specialisti.

Versione: Giugno 2022

Fonte di riferimento: www.swissmedicinfo.ch (2022)

© L’associazione Terapia orale dei tumori www.terapieorallinoncologia.ch

Supportato da

