



Merkblatt für Patientinnen und Patienten

Verzenios® (Abemaciclib)

Verzenios® wurde von Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt für Sie ausgewählt.
Sie können die Therapie positiv beeinflussen, wenn Sie die nachfolgenden Informationen beachten.

Wie sieht Verzenios® aus?



Verzenios® Tabletten zu 50 mg: Beige, ovale Tabletten auf der einen Seite mit «50», auf der anderen Seite mit «Lilly» gekennzeichnet.
Verzenios® Tabletten zu 100 mg: Weisse, ovale Tabletten auf der einen Seite mit «100» auf der anderen Seite mit «Lilly» gekennzeichnet.
Verzenios® Tabletten zu 150 mg: Gelbe, ovale Tabletten auf der einen Seite mit «150», auf der anderen Seite mit «Lilly» gekennzeichnet.
Verzenios® Tabletten zu 200 mg: Beige, ovale Tabletten auf der einen Seite mit «200», auf der anderen Seite mit «Lilly» gekennzeichnet.

Wie muss Verzenios® aufbewahrt werden?

Bewahren Sie das Medikament bei Raumtemperatur auf.

Wie ist die Dosierung von Verzenios®?

Nehmen Sie die Tabletten/Kapseln in der Dosierung gemäss Verordnung Ihrer Ärztin/Ihres Arztes ein.

Wie nehme ich Verzenios® ein?

- Nehmen Sie die verordneten Tabletten morgens und abends (2 Mal/Tag) möglichst zur gleichen Zeit mit einem Glas Wasser ein.
- Sie können die Tabletten mit oder ohne Nahrung einnehmen.
- Schlucken Sie die Tabletten ganz. Die Tabletten weder kauen, noch brechen oder mörsern.

Was mache ich, wenn ich ...

... das Medikament vergessen habe?

- Notieren Sie sich dieses Datum.
- Die ausgelassene Dosis wird nicht nachträglich eingenommen.
- Fahren Sie mit der Therapie zur festgelegten Zeit normal weiter.

... das Medikament erbrechen musste?

- Nehmen Sie keine neuen Tabletten ein.
- Nehmen Sie die nächste Dosis zur gewohnten Zeit ein.

... zu viele Kapseln eingenommen habe?

- Kontaktieren Sie Ihr Behandlungsteam, damit die nächste Dosis festgelegt werden kann.

Welche Nebenwirkungen sind häufig?

Was kann ich dagegen tun?

Appetitverlust

- Es kann hilfreich sein, wenn Sie mehrere kleine Portionen zu sich nehmen und bevorzugt Speisen wählen, auf die Sie Lust haben.

Durchfall

- Achten Sie darauf, dass Sie mindestens 2 Liter pro Tag trinken (z.B. Wasser, Tee, Bouillon).
- Bei leichtem Durchfall ist eine Ernährungsanpassung mit Reis, weissem Brot, Bananen sinnvoll.
- Nehmen Sie frühzeitig ein Medikament mit dem Wirkstoff Loperamid (Imodium®) ein.

