

Comment conserver Verzenios® ?

Conserver le médicament à température ambiante.

À quelle dose Verzenios® doit-il être utilisé ?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Verzenios® ?

- Prenez les comprimés matin et soir (2 fois /jour) si possible à la même heure, avec un verre d'eau.
- Vous pouvez prendre les comprimés avec ou sans nourriture.
- Avalez les comprimés entiers. Ne pas les mâcher, ni les casser ou les écraser.

Qu'est-ce que je fais si...

...j'ai oublié le médicament ?

- Notez la date de l'oubli.
- Ne prenez pas la dose oubliée par la suite le même jour.
- Continuez votre traitement sans changement à l'heure normalement prévue.

...j'ai vomi le médicament ?

- Ne prenez pas de nouveaux comprimés.
- Prenez la dose suivante sans changement à l'heure habituelle.

...j'ai pris trop de comprimés /capsules ?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents ?

Que puis-je faire ?

Perte d'appétit

- Il peut être utile de consommer plusieurs petites portions et de choisir de préférence des aliments dont vous avez envie.

Diarrhées

- Buvez environ 2 litres par jour (p.ex. eau, thé, bouillon).
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Prenez sans tarder du Lopéramide (p.ex. Imodium®) selon prescription.

Nausées, vomissements

- Prenez les médicaments prescrits sans attendre.
- Si vous n'obtenez aucune amélioration dans les 24 heures, contactez votre médecin.

Éruptions cutanées

- Effectuer les soins de la peau selon les instructions de l'équipe de traitement.
- N'utilisez aucun produit sans consulter au préalable votre équipe de traitement.

Fatigue

- En cas de fatigue importante, veuillez faire preuve de prudence lors de la conduite de véhicule ou de l'utilisation de machines dangereuses.

Vertiges

- Prenez contact avec votre équipe de traitement.

Quand dois-je informer mon équipe soignante ?

- Si vous remarquez des signes d'infection tels que fièvre supérieure à 38°C, des frissons, une irritation de la gorge ou une toux et un rhume.
- Si vous souffrez de nausées persistantes, de vomissements et/ou de douleurs abdominales.
- Si la diarrhée ne peut être arrêtée avec la prise de Lopéramide (par ex. Imodium®) à la dose prescrite, soit avec un maximum de 8 gélules/comprimés par jour.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou de troubles inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez. Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir ?

- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.
- Vous ne devez pas prendre de préparations à base de pamplemousse ou de millepertuis pendant le traitement. Ces produits peuvent interférer avec l'effet du médicament. Par conséquent, veillez à ne pas consommer ces produits pendant le traitement.