



Information pour les patients

Verzenios® (Abemaciclib)

Verzenios® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Verzenios® ?



Verzenios® :

Verzenios® comprimés à 50 mg : comprimés ovales beige, marqués d'un côté avec «50» et de l'autre côté avec «Lilly».

Verzenios® comprimés à 100 mg : comprimés ovales blancs, marqués d'un côté avec «100» et de l'autre côté avec «Lilly».

Verzenios® comprimés à 150 mg : comprimés ovales jaune, marqués d'un côté avec «150» et de l'autre côté avec «Lilly».

Verzenios® comprimés à 200 mg : comprimés ovales beige, marqués d'un côté avec «200» et de l'autre côté avec «Lilly».

Comment conserver Verzenios® ?

Conserver le médicament à température ambiante.

À quelle dose Verzenios® doit-il être utilisé ?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Verzenios® ?

- Prenez les comprimés matin et soir (2 fois /jour) si possible à la même heure, avec un verre d'eau.
- Vous pouvez prendre les comprimés avec ou sans nourriture.
- Avalez les comprimés entiers. Ne pas les mâcher, ni les casser ou les écraser.

Qu'est-ce que je fais si...

...j'ai oublié le médicament ?

- Notez la date de l'oubli.
- Ne prenez pas la dose oubliée par la suite le même jour.
- Continuez votre traitement sans changement à l'heure normalement prévue.

...j'ai vomi le médicament ?

- Ne prenez pas de nouveaux comprimés.
- Prenez la dose suivante sans changement à l'heure habituelle.

...j'ai pris trop de comprimés /capsules ?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents ?

Que puis-je faire ?

Perte d'appétit

- Il peut être utile de consommer plusieurs petites portions et de choisir de préférence des aliments dont vous avez envie.

Diarrhées

- Buvez environ 2 litres par jour (p.ex. eau, thé, bouillon).
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Prenez sans tarder du Lopéramide (p.ex. Imodium®) selon prescription.

