

Personnes de contact

Médecin _____

Infirmier/ère _____

Pharmacie _____

Urgences _____

Remarques

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.

Version : décembre 2022
Référence : www.swissmedicinfo.ch (2022)

© L'association Anticancéreux par voie orale www.anticancereuxoraux.ch

Soutenu par

 Onkologiepflege Schweiz
Soins en Oncologie Suisse
Cure Oncologica Svizzera

 SSMO
SSOM
SGMO



Orale Tumor Therapie
Anti Cancereux Oraux
Therapie Orali in Oncologia
.ch

Information pour les patients

Vizimpro® (Dacomitinib)

Vizimpro® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Vizimpro® ?



Vizimpro® : Comprimés pelliculés à 15 mg, 30 mg et 45 mg.
Comprimés bleus, ronds, marqué „Pfizer“ d'un côté et „DCB15“, „DCB30“ ou „DCB45“ sur l'autre selon le dosage.

Comment conserver Vizimpro® ?

Conserver le médicament à température ambiante.

À quelle dose Vizimpro® doit-il être utilisé ?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Vizimpro® ?

- Prenez les comprimés avec un verre d'eau, en une prise par jour et si possible à la même heure.
- Vous pouvez prendre les comprimés avec ou sans nourriture.
- Avalez les comprimés entiers sans les mâcher, ni les casser ou les écraser.

Qu'est-ce que je fais si...

...j'ai oublié le médicament ?

- Prenez les comprimés dès que possible le lendemain.
- Prenez note de la date de l'oubli.

...j'ai vomi le médicament ?

- Ne prenez pas de nouveaux comprimés.
- Poursuivez le traitement sans changement le lendemain.

...j'ai pris trop de comprimés /capsules ?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents ?

Que puis-je faire ?

Diarrhées

- Prenez du loperamide (p. ex. Imodium®) suffisamment tôt dès l'apparition des diarrhées.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Veillez à boire en quantité suffisante environ 2 litres par jour (p. ex. de l'eau, du thé ou du bouillon).

Inflammation de la muqueuse buccale

- Rincez la bouche avec de l'eau ou de l'eau salée (½ - 1 cuillère à café/litre d'eau) plusieurs fois par jour, au moins après chaque repas.

Éruption cutanée

- Effectuez les soins de la peau selon les instructions de l'équipe de traitement.
- N'utilisez aucun produit sans consulter au préalable votre équipe de traitement.

Perte d'appétit et perte de poids

- Il peut être utile de manger plusieurs petites portions et de privilégier les aliments que vous avez envie de manger.
- Contactez votre équipe de traitement si vous avez une perte d'appétit prolongée.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante ?

- Si la diarrhée ne peut être interrompue avec la posologie normale de la substance active de loperamide (par exemple Imodium®) soit avec un maximum de 8 capsules/comprimés par jour.
- Si vous éprouvez des difficultés à avaler du fait de l'apparition d'aphtes ou de lésions dans la bouche.
- En cas de modification de la peau (éruption cutanée, rougeurs, augmentation de la rougeur des mains et des pieds).
- En cas d'apparition de toux et/ou de difficulté respiratoire.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou d'autres troubles inexpliqués.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez. Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir ?

- N'interrompez pas votre traitement sans consulter votre médecin.
- Les inhibiteurs de la pompe à protons (inhibiteurs de l'acidité gastrique) peuvent interférer avec l'effet de Vizimpro®. Vous ne devez pas prendre de tels médicaments pendant le traitement. Discutez-en avec votre médecin.