



Information pour les patients

Vizimpro® (Dacomitinib)

Vizimpro® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Vizimpro® ?



Vizimpro® : Comprimés pelliculés à 15 mg, 30 mg et 45 mg.
Comprimés bleus, ronds, marqué „Pfizer“ d’un côté et „DCB15“, „DCB30“ ou „DCB45“ sur l’autre selon le dosage.

Comment conserver Vizimpro® ?

Conserver le médicament à température ambiante.

À quelle dose Vizimpro® doit-il être utilisé ?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Vizimpro® ?

- Prenez les comprimés avec un verre d’eau, en une prise par jour et si possible à la même heure.
- Vous pouvez prendre les comprimés avec ou sans nourriture.
- Avalez les comprimés entiers sans les mâcher, ni les casser ou les écraser.

Qu’est-ce que je fais si...

...j’ai oublié le médicament ?

- Prenez les comprimés dès que possible le lendemain.
- Prenez note de la date de l’oubli.

...j’ai vomi le médicament ?

- Ne prenez pas de nouveaux comprimés.
- Poursuivez le traitement sans changement le lendemain.

...j’ai pris trop de comprimés /capsules ?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents ? Que puis-je faire ?

Diarrhées

- Prenez du loperamide (p. ex. Imodium®) suffisamment tôt dès l’apparition des diarrhées.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Veillez à boire en quantité suffisante environ 2 litres par jour (p. ex. de l’eau, du thé ou du bouillon).

Inflammation de la muqueuse buccale

- Rincez la bouche avec de l’eau ou de l’eau salée (½ - 1 cuillère à café/litre d’eau) plusieurs fois par jour, au moins après chaque repas.

