

Information pour les patients

Votrient® (Pazopanib)

Votrient® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Votrient®?



Votrient® comprimés à 200 mg et 400 mg:

Comprimés à 200 mg: Comprimés filmés allongés roses, marqués d'un côté avec «GS JT».

Comprimés à 400 mg: Comprimés filmés allongés blancs, marqués d'un côté avec «GS UHL».

Comment conserver Votrient®?

Entreposez le médicament à l'air ambiant.

A quelle dose Votrient® doit être utilisé?

Prenez les capsules à la dose prescrite par votre médecin.

Comment dois-je prendre Votrient®?

- Vous devez prendre tous les comprimés de la dose quotidienne prescrite en une seule fois, au moins 1 heure avant ou 2 heures après un repas léger.
- Avalez les comprimés en entier. Ne pas mâcher, casser, ouvrir ou écraser les comprimés.

Qu'est-ce que je fais si...

... j'ai oublié le médicament?

- Vous pouvez prendre la dose manquée jusqu'à 12 heures plus tard le même jour.
- Ne prenez jamais deux doses journalières le même jour.
- Notez cette date.

... j'ai vomi le médicament?

- Ne prenez pas de nouveaux comprimés le même jour.
- Continuez le traitement le lendemain sans changement.

... j'ai pris trop de comprimés?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents ? Que puis-je faire?

Diarrhées

- Prenez sans tarder du Lopéramide (p.ex. Imodium®) selon prescription.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Buvez environ 2 litres par jour (p.ex. eau, thé, bouillon).

Nausées, vomissements

- Prenez les médicaments prescrits sans attendre.

Eruptions cutanées et modification de la couleur des cheveux ou chute de cheveux

- Suivez les instructions pour les soins de peau données par votre équipe soignante.
- Faites-vous conseiller par votre équipe soignante pour une perruque ou d'autres moyens adaptés.

Fatigue et faiblesse

- En cas de grande fatigue, faites preuve de prudence en cas de conduite d'un véhicule ou d'utilisation de machines dangereuses.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante?

- Si la diarrhée ne peut être stoppée avec la prise de Lopéramide (par ex. Imodium®) à la dose prescrite, soit avec un maximum de 8 gélules/comprimés par jour.
- Si vous souffrez de palpitations cardiaques, d'essoufflement, de difficulté à avaler ou d'étourdissements.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez. Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir?

- Pendant le traitement, vous ne devez pas absorber de préparation à base de pamplemousse. Ces produits peuvent interférer avec l'effet du Votri-ent®. Abstenez-vous donc de consommer ces produits pendant le traitement.
- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.

Personnes de contact

Médecin

Infirmières

Pharmacie

Urgences

Remarques

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.

Version: Juillet 2015

Référence: www.swissmedicinfo.ch

© Société Suisse d'Oncologie Médicale/Soins en Oncologie Suisse