



## Come si conserva Votrient®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

## Come si dosa Votrient®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

## Come si somministra Votrient®?

- Assuma tutte le compresse della dose giornaliera prescritta in una sola volta, almeno 1 ora prima o 2 ore dopo un pasto leggero.
- Non divida, sciolga o trituri le compresse, ma le deglutisca intere, senza masticarle.

## Che cosa faccio se ...

### ... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Assuma la dose dimenticata il più presto possibile, ma in ogni caso entro 12 ore.
- Non assuma dosi supplementari per compensare la dose dimenticata.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.

### ... ho vomitato il farmaco?

- Non assuma il farmaco un'altra volta.
- Prosegua la terapia il giorno successivo, attenendosi al consueto orario di somministrazione.

### ... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

## Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

### Che cosa posso fare per contrastarli?

#### Diarrea

- Assuma tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Consigliamo di bere circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

#### Nausea/vomito

- Assuma tempestivamente i farmaci che Le sono stati prescritti contro tali effetti secondari.
- Contatti il Suo medico qualora tali effetti secondari si aggravassero o perdurassero oltre 24 ore.

#### Eruzioni cutanee e cambiamenti del colore o perdita dei capelli

- Curi la pelle come consigliato dall'équipe curante.
- Non faccia uso di prodotti per la cute non espressamente consentiti dall'équipe curante.
- Chieda consiglio alla Sua équipe curante in merito a parrucche e copricapo.

#### Debolezza e stanchezza

- La debolezza e la stanchezza possono ridurre l'idoneità alla guida e la capacità di azionare macchine o attrezzi pericolosi.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

## Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Diarrea persistente malgrado la somministrazione della dose massima (8 capsule al giorno) della sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium).
- Palpitazioni, respirazione o deglutizione difficoltose o capogiri.
- Disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

**Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.**

## Che cos'altro devo sapere?

- I prodotti contenenti pompelmo possono interferire sull'efficacia del farmaco. Si astenga pertanto dal consumo di tali sostanze durante la terapia con Votrient®.
- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.