



Informazioni riassuntive per il paziente

Votrient® (Pazopanib)

Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale **Votrient®.
Le seguenti informazioni Le consentiranno di aderire in modo ottimale alla
terapia.**

Che aspetto ha **Votrient®**?



Votrient® è disponibile in compresse rivestite con film da 200 mg e 400 mg:
Le compresse da 200 mg sono rosa, allungate senza linea di frattura, con
impresso “GS JT” su un lato.
Le compresse da 400 mg sono bianche, allungate senza linea di frattura, con
impresso “GS UHL” su un lato.

Come si conserva **Votrient®**?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa **Votrient®**?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra **Votrient®**?

- Assuma tutte le compresse della dose giornaliera prescritta in una sola volta, almeno 1 ora prima o 2 ore dopo un pasto leggero.
- Non divida, sciolga o trituri le compresse, ma le deglutisca intere, senza masticarle.

Che cosa faccio se ...

... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Assuma la dose dimenticata il più presto possibile, ma in ogni caso entro 12 ore.
- Non assuma dosi supplementari per compensare la dose dimenticata.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.

... ho vomitato il farmaco?

- Non assuma il farmaco un'altra volta.
- Proseguo la terapia il giorno successivo, attenendosi al consueto orario di somministrazione.

... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

Che cosa posso fare per contrastarli?

Diarrea

- Assuma tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Consigliamo di bere circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

