

Comment conserver Xagrid® ?

Conserver le médicament à température ambiante.

À quelle dose Xagrid® doit-il être utilisé ?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Xagrid® ?

- Prenez si possible les gélules en 2 prises par jour matin et soir à la même heure, soit toujours avec un repas, soit toujours à jeûn (½ h avant ou 2 h après le repas).
- Avalez les gélules entières. Ne pas les mâcher, ni les ouvrir ou les écraser.

Qu'est-ce que je fais si...

...j'ai oublié le médicament ?

- Ne prenez pas la dose omise plus tard. Prenez la prise suivante à l'heure habituelle, le soir ou le lendemain matin.

...j'ai vomi le médicament ?

- Ne prenez pas de nouvelles gélules.
- Poursuivez le traitement sans changement le soir même ou le lendemain matin.

...j'ai pris trop de comprimés /capsules ?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents ?

Que puis-je faire ?

Mal de tête

- Les antidouleurs habituels en vente libre (par exemple, le paracétamol) sont autorisés.
- Contactez votre équipe de soins.

Diarrhées

- Prenez du loperamide (p. ex. Imodium®) suffisamment tôt dès l'apparition des diarrhées.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Veillez à boire en quantité suffisante environ 2 litres par jour (p. ex. de l'eau, du thé ou du bouillon).

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe de traitement ?

- Si vous souffrez de gonflement au niveau des jambes, d'essoufflement ou de palpitations.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou d'autres troubles inexpliqués.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez. Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir ?

- Ne prenez pas de préparations à base de pamplemousse pendant le traitement. Ces produits peuvent interférer avec l'effet du médicament. Veillez à ne pas consommer ces produits pendant le traitement.
- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.
- Ne prenez pas d'aspirine sans l'accord de votre médecin (risque d'hémorragie).