

Information pour les patients

Xalkori® (Crizotinib)

Xalkori® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Xalkori®?



Xalkori® capsules à 200 mg et 250 mg.

Capsules à 200 mg: Capsules roses et blanches, marquées sur le dessus avec «Pfizer» et sur la partie inférieure avec «CRZ 200».

Capsules à 250 mg: Capsules roses, marquées sur le dessus avec «Pfizer» et sur la partie inférieure avec «CRZ 250».

Comment conserver Xalkori®?

Entreposez le médicament à l'air ambiant.

A quelle dose Xalkori® doit être utilisé?

Prenez les capsules à la dose prescrite par votre médecin.

Comment dois-je prendre Xalkori®?

- Prenez les capsules avec un verre d'eau, matin et soir, de préférence toujours à la même heure.
- Vous pouvez prendre les capsules avec ou sans nourriture.
- Avalez les capsules en entier. Ne pas mâcher, casser, ouvrir ou écraser les capsules.

Qu'est-ce que je fais si...

... j'ai oublié le médicament?

- Vous pouvez prendre la dose manquée, dans les 6 heures, le même jour.
- Prenez la prochaine dose à l'heure habituelle du jour suivant.
- Ne prenez jamais deux doses journalières le même jour.
- Notez cette date.

... j'ai vomi le médicament?

- Ne prenez pas de nouvelles capsules le même jour.
- La dose prochaine est prise à l'heure fixée le même soir ou le lendemain matin.

... j'ai pris trop de capsules?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents?

Que puis-je faire?

Troubles visuels (éclairs lumineux, vision floue, vision double, lignes/anneaux/points, anomalies du champ visuel)

- Signalez ces symptômes à votre médecin.

Nausées, vomissements

- Prenez les médicaments prescrits sans attendre.

Diarrhées

- Prenez sans tarder du Lopéramide (p.ex. Imodium®) selon prescription.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Buvez environ 2 litres par jour (p.ex. eau, thé, bouillon).

Vertiges

- Contactez votre équipe soignante.

Engourdissement, picotements dans les articulations, les membres ou les muscles

- Vous devez absolument signaler ces symptômes à votre médecin lors de votre prochain rendez-vous.

Œdème (Gonflement des mains et/ou des pieds)

- Contactez votre équipe soignante sans attendre.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante?

- En cas de fièvre supérieure à 38°C.
- Si vous souffrez d'essoufflement, éventuellement accompagnés de toux et de fièvre.
- En cas de coloration jaunâtre de la peau ou du blanc des yeux.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez. Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir?

- Pendant le traitement, vous ne devez pas absorber de préparation à base de pamplemousse ou de millepertuis. Ces produits peuvent interférer avec l'effet du Xalkori®. Abstenez-vous donc de consommer ces produits pendant le traitement.
- Les patients sont souvent fatigués sous Xalkori®, l'aptitude à conduire ou faire fonctionner des machines dangereuses peut être limitée.
- En raison du risque de malformations congénitales chez les enfants à naître, les femmes en âge de procréer et les hommes ayant une partenaire en âge de procréer doivent absolument utiliser un moyen de contraception fiable, sous traitement de Xalkori® et jusqu'à 3 mois après traitement.
- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.

Personnes de contact

Médecin

Infirmières

Pharmacie

Urgences

Remarques

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.

Version: Décembre 2013

Référence: www.swissmedicinfo.ch

© Société Suisse d'Oncologie Médicale/Soins en Oncologie Suisse