

Que dois-je encore savoir?

N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.

Personnes de contact

Médecin

Infirmières

Pharmacie

Urgences

Remarques

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.

Version: Septembre 2012

Référence: www.swissmedicinfo.ch

© Société Suisse d'Oncologie Médicale/Soins en Oncologie Suisse

Information pour les patients

Xeloda® (Capécitabine)

Xeloda® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations ci-après.

Comment se présente Xeloda®?



Xeloda® comprimés à 150 mg et 500 mg.

Comprimés à 150 mg: Comprimés rose clair, ovales, marqués d'un côté «150» et de l'autre avec «XELODA».

Comprimés à 500 mg: Comprimés rose foncé, ovales, marqués d'un côté «500» et de l'autre «XELODA».

Comment conserver Xeloda®?

Entreposez le médicament à l'air ambiant.

A quelle dose Xeloda® doit être utilisé?

Prenez les comprimés à la dose prescrite par votre médecin.

Comment dois-je prendre Xeloda®?

- Prenez les comprimés avec un verre d'eau, matin et soir, dans les 30 minutes après un repas.
- Avalez les comprimés en entier. Ne pas mâcher, casser, ouvrir ou écraser les comprimés.

Qu'est-ce que je fais si ...

... j'ai oublié le médicament?

- La dose manquée n'est pas prise ultérieurement.
- La dose prochaine est prise à l'heure fixée le même soir ou le lendemain matin.
- Notez cette date.

... j'ai vomi le médicament?

- Ne prenez pas de nouveaux comprimés de suite.
- La dose prochaine est prise à l'heure fixée le même soir ou le lendemain matin.

... j'ai pris trop de comprimés filmés?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents?

Que puis-je faire?

Rougeurs, cloques et douleur dans les mains et les plantes des pieds

- Dès le début du traitement, frotter la paume de vos mains et la plante de vos pieds avec une crème ou une lotion grasse.
- Évitez les températures extrêmes (p.ex. ne laissez pas les mains longtemps dans l'eau chaude).
- Évitez les excès de pression (p.ex. les chaussures serrées).
- En cas de douleur et d'apparition d'ampoules, stoppez le traitement et prenez immédiatement contact avec votre médecin.

Diarrhées

- Prenez sans tarder du Lopéramide (p.ex. Imodium®) selon prescription.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Buvez environ 2 litres par jour (p.ex. eau, thé, bouillon).

Nausées, vomissements

- Prenez les médicaments prescrits sans attendre.
- Si vous n'obtenez aucune amélioration dans les 24 heures, contactez votre médecin.

Inflammation de la muqueuse buccale

- Rincez la bouche au minimum après chaque repas avec de l'eau ou de l'eau salée (1/2 - 1 c à t./litre d'eau).
- Sans amélioration et si vous avez de la peine à boire ou à manger, contactez votre équipe soignante.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante?

- Si la diarrhée ne peut être stoppée avec la prise de Lopéramide (p.ex. Imodium®) à la dose prescrite, soit avec un maximum de 8 gélules/comprimés par jour.
- Si vous êtes gêné par des lésions rugueuses ou ouvertes dans la bouche.
- Si vous avez des douleurs derrière le sternum (douleurs dans la région du cœur).
- Si vous avez des difficultés à avaler.
- En cas de fièvre supérieure à 38 C ou de saignement.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez. Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.