



Information pour les patients

Xtandi® (Enzalutamid)

Xtandi® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Xtandi® ?



Xtandi® : Comprimés à 40mg.

Comprimés pelliculés ronds, jaunes, marqués d'un côté avec « E40 ».

Comment conserver Xtandi® ?

Conserver le médicament à température ambiante.

À quelle dose Xtandi® doit-il être utilisé ?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Xtandi® ?

- Prenez les comprimés en une prise par jour, si possible à la même heure, avec un verre d'eau.
- Vous pouvez prendre les comprimés avec ou sans nourriture.
- Avalez les comprimés entiers. Ne pas mâcher, ni casser, ni ouvrir ou écraser les comprimés.

Qu'est-ce que je fais si...

...j'ai oublié le médicament ?

- Vous pouvez prendre le comprimé oublié le même jour.
- Ne prenez jamais deux doses journalières le même jour.
- Notez la date de l'oubli.

...j'ai vomi le médicament ?

- Ne prenez pas de nouveaux comprimés le même jour.
- Continuez le traitement le lendemain sans changement.

...j'ai pris trop de comprimés /capsules ?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents ?

Que puis-je faire ?

Maux de tête, douleurs dans les membres et les articulations

- Les antidouleurs habituels en vente libre (par exemple, le paracétamol) sont autorisés.

Bouffées de chaleur

- Normalement les bouffées de chaleur diminuent en avançant dans le traitement.
- Discutez avec votre équipe de traitement et votre médecin des possibilités permettant de soulager vos symptômes en modifiant votre style de vie.

Fatigue

- En cas de fatigue importante, veuillez faire preuve de prudence lors de la conduite de véhicule ou de l'utilisation de machines dangereuses.

Sautes d'humeur, troubles du sommeil, troubles de la concentration

- Les formes prononcées peuvent être traitées par des médicaments.

Troubles de la vision

- Parlez-en à votre médecin.

Modifications de la peau

- Effectuez les soins de la peau selon les instructions de l'équipe de traitement.

Diarrhées

- Prenez sans tarder du Lopéramide (p.ex. Imodium®) selon prescription.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Buvez environ 2 litres par jour (p.ex. eau, thé, bouillon).

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe de traitement ?

- En cas de fièvre supérieure à 38°C.
- Si vous souffrez d'essoufflement et/ou de palpitations cardiaques.
- En cas de convulsion.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou de troubles inexpliqués.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez. Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir ?

- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.

Personnes de contact

Médecin

Infirmier/ère

Pharmacie

Urgences

Remarques

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.

Version : novembre 2021
Référence : www.swissmedinfo.ch (2021)

© L'association Anticancéreux par voie orale www.anticancereuxoraux.ch

Soutenu par


Onkologiepflege Schweiz
Soins en Oncologie Suisse
Cure Oncologica Svizzera

SSMO
SSOM
SGMO