

Comment conserver Zejula® ?

Conserver à température ambiante.

À quelle dose Zejula® doit-il être utilisé ?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Zejula® ?

- Vous pouvez prendre les gélules avec ou en dehors des repas.
- Prenez les gélules chaque jour et si possible à la même heure en une seule prise.
- Avalez les gélules entières. Ne pas les mâcher, ni les casser, ni les ouvrir ou les écraser.

Qu'est-ce que je fais si ...

... dj'ai oublié le médicament ?

- Ne pas prendre la dose omise a posteriori ; la prochaine prise a lieu le jour suivant à l'heure habituelle de la journée.
- Ne prenez jamais deux doses quotidiennes le même jour.
- Prenez note de la date de l'oubli.

... j'ai vomi le médicament ?

- Ne prenez pas de nouveaux comprimés.
- Poursuivez le traitement sans changement le jour suivant.

... j'ai pris trop de gélules ?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents ?

Que puis-je faire ?

Diarrhées

- Prenez du lopéramide (p. ex. Imodium®) suffisamment tôt dès l'apparition des diarrhées.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Veillez à boire en quantité suffisante environ 2 litres par jour (p. ex. de l'eau, du thé ou du bouillon).

Nausées, vomissements, perte d'appétit

- Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements sans attendre.
- S'il n'y a pas d'amélioration dans les 24 heures, contactez votre médecin.

Éruption cutanée

- Effectuer les soins de la peau selon les instructions de l'équipe de traitement.
- N'utilisez aucun produit sans consulter au préalable votre équipe de soins.
- Appliquez minutieusement sur votre peau un écran solaire facteur 50.

Fatigue

- En cas de somnolence importante, soyez prudent lorsque vous conduisez des véhicules ou si vous utilisez des machines dangereuses.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante ?

- En cas de fièvre supérieure à 38 °C.
- En cas de saignement, par exemple : Nez, gencives.
- En cas d'infection urinaire.
- Si vous souffrez récemment d'essoufflement.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou d'autres troubles inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez.

Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir ?

- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.