

Come si conserva Zejula®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Zejula®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Zejula®?

- Assuma la dose prescritta ogni giorno all'incirca alla stessa ora con un bicchiere d'acqua.
- Indipendentemente dal pasto.
- Deglutisca le capsule intere, non devono essere aperte, sciolte, spezzate o masticate.

Che cosa faccio se ...

... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Non assuma più tardi la dose dimenticata. Prosegua la terapia il giorno successivo, attenendosi al consueto orario di somministrazione.
- Non assuma una dose doppia, durante lo stesso giorno, per compensare la dimenticanza.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.

... ho vomitato il farmaco?

- Non assuma il farmaco un'altra volta.
- Prosegua la terapia il giorno successivo, attenendosi al consueto orario di somministrazione.

... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

Che cosa posso fare per contrastarli?

Diarrea

- Assuma tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Consigliamo di bere circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

Nausea/vomito

- Assuma tempestivamente i farmaci che Le sono stati prescritti contro tali effetti secondari.
- Contatti il Suo medico qualora tali effetti secondari si aggravassero o perdurassero oltre 24 ore.

Eruzioni cutanee

- Curi la pelle come consigliato dall'équipe curante.
- Non faccia uso di prodotti per la cute non espressamente consentiti dall'équipe curante.
- Utilizzi una protezione solare ad ampio spettro contro i raggi ultravioletti (fattore di protezione [SPF] ≥ 50).

Debolezza e stanchezza

- La debolezza e la stanchezza possono ridurre l'idoneità alla guida e la capacità di azionare macchine o attrezzi pericolosi.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Febbre oltre i 38 °C.
- Segni di sanguinamento, p. es. epistassi (sanguinamento dal naso) o emorragie gengivali.
- In caso di cistite.
- In caso di comparsa di mancanza di respiro.
- Disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.

Che cos'altro devo sapere?

- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.