



Orale Tumor Therapie  
Anti Cancereux Oraux  
Therapie Orali in Oncologia

.ch

## Informazioni riassuntive per il paziente

# Zejula® (Niraparib)

Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale Zejula®.  
Le seguenti informazioni Le consentiranno di aderire in modo ottimale alla terapia.

## Che aspetto ha Zejula®?



Zejula® è disponibile in capsule rigide da 100 mg: corpo bianco con impresso "100 mg" con inchiostro nero e cappuccio viola con impresso "niraparib" con inchiostro bianco.

## Come si conserva Zejula®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

## Come si dosa Zejula®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

## Come si somministra Zejula®?

- Assuma la dose prescritta ogni giorno all'incirca alla stessa ora con un bicchiere d'acqua.
- Indipendentemente dal pasto.
- Deglutisca le capsule intere, non devono essere aperte, sciolte, spezzate o masticate.

## Che cosa faccio se ...

### ... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Non assuma più tardi la dose dimenticata. Prosegua la terapia il giorno successivo, attenendosi al consueto orario di somministrazione.
- Non assuma una dose doppia, durante lo stesso giorno, per compensare la dimenticanza.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.

### ... ho vomitato il farmaco?

- Non assuma il farmaco un'altra volta.
- Prosegua la terapia il giorno successivo, attenendosi al consueto orario di somministrazione.

### ... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

## Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

### Che cosa posso fare per contrastarli?

#### Diarrea

- Assuma tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Consigliamo di bere circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

### Nausea/vomito

- Assuma tempestivamente i farmaci che Le sono stati prescritti contro tali effetti secondari.
- Contatti il Suo medico qualora tali effetti secondari si aggravassero o perdurassero oltre 24 ore.

### Eruzioni cutanee

- Curi la pelle come consigliato dall'équipe curante.
- Non faccia uso di prodotti per la cute non espressamente consentiti dall'équipe curante.
- Utilizzi una protezione solare ad ampio spettro contro i raggi ultravioletti (fattore di protezione [SPF]  $\geq$  50).

### Debolezza e stanchezza

- La debolezza e la stanchezza possono ridurre l'idoneità alla guida e la capacità di azionare macchine o attrezzi pericolosi.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

### Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Febbre oltre i 38 °C.
- Segni di sanguinamento, p. es. epistassi (sanguinamento dal naso) o emorragie gengivali.
- In caso di cistite.
- In caso di comparsa di mancanza di respiro.
- Disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

**Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume.  
Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.**

### Che cos'altro devo sapere?

- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.

### Contatti

Medico

---

Personale infermieristico

---

Farmacista

---

Pronto soccorso

---

### Appunti

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Con queste informazioni sintetiche, l'équipe curante intende facilitare la somministrazione della terapia orale ai pazienti oncologici e ai familiari curanti. La presente scheda informativa vuole essere un complemento al foglietto illustrativo e alle informazioni fornite dagli specialisti.

Versione: Aprile 2021

Fonte di riferimento: [www.swissmedicinfo.ch](http://www.swissmedicinfo.ch)

© L'associazione Terapia orale dei tumori [www.terapiaoraliinoncologia.ch](http://www.terapiaoraliinoncologia.ch)

Supportato da

