



## Information pour les patients

# Zytiga® (Abiraterone)

Zytiga® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

## Comment se présente Zytiga®?



Zytiga® comprimés à 500 mg: Comprimés blancs, ovales, marqués d'un côté avec «AA 500».

## Comment conserver Zytiga®?

Entreposez le médicament à l'air ambiant.

## A quelle dose Zytiga® doit être utilisé?

Prenez les comprimés à la dose prescrite par votre médecin.

## Comment dois-je prendre Zytiga®?

- Prenez les comprimés en une prise par jour avec un verre d'eau, de préférence toujours à la même heure.
- Vous devez prendre tous les comprimés de la dose quotidienne prescrite en une seule fois, au moins 1 heure avant ou 2 heures après un repas léger.

## Qu'est-ce que je fais si ...

### ... j'ai oublié le médicament?

- Prenez la dose manquée par la suite le même jour.
- Prenez la prochaine dose à l'heure habituelle du jour suivant.
- Ne prenez jamais deux doses journalières le même jour.
- Notez cette date.

### ... j'ai vomi le médicament?

- Ne prenez pas de nouveaux comprimés le même jour.
- Continuez le traitement le lendemain sans changement.

### ... j'ai pris trop de comprimés filmés?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

## **Quels sont les effets indésirables fréquents? Que puis-je faire?**

### **OEdème ou articulations enflées**

- Prenez contact avec votre équipe soignante sans attendre.

### **Troubles de la miction**

- Contactez votre équipe soignante.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

## **Quand dois-je informer mon équipe soignante?**

- Si vous souffrez d'essoufflement et/ou de palpitations cardiaques.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou inexplicables.

## **Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez. Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.**

## **Que dois-je encore savoir?**

- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.
- Ne prenez pas de médicaments contre les bouffées de chaleur (y compris ceux en vente libre) sans consulter votre médecin. Ces produits peuvent interférer avec l'effet des médicaments.